

Blommor för bin



Blommor för bin

– en sammanställning av olika örters attraktionsvärde för bin

JO22:6, Jordbruksverket

Författare: Björn Gustavsson **Foton:** Björn Gustavsson

Citeras som: Gustavsson, B. 2022. Blommor för bin – en sammanställning av olika örters attraktionsvärde för bin. JO22:6 Jordbruksverket.

Publikationen bekostas av medel från det nationella programmet för biodlingssektorn – Jordbruksverket. Det nationella programmet finansieras av europeiska garantifonden för jordbruk.

Ett stort tack vill jag rikta till de personer som varit till stor hjälp med granskning och genomläsning av manus: Petter Haldén, Preben Kristiansen, Thorsten Rahbek-Pedersen, Sandra Lindström, Lena Andersson, Jenny Henriksson och Britta Lundström.

Innehållsförteckning

Blommor för bin – attraktionskraft och blomningstid	11
Blommor för bin – tilläggsinformation	27
Pollenets proteininnehåll	37
Index – svenska och vetenskapliga namn	38



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7




Bild 8



Bild 9

Bild 1. Honungsbi på praktnäva (*Geranium spp.*)

Bild 2. Höstraps (*Brassica napus*)

Bild 3. Vitklöverfält (*Trifolium repens*)

Bild 4. Rödklöverfält (*Trifolium pratense*) med bikupor i bakgrunden (mittenbilden)

Bild 5. Jordhumla på vallört (*Symphytum officinale*)

Bild 6. Honungsbi på vintergäck (*Eranthis hiemalis*)

Bild 7. Stenhumla på stäppsalia (*Salvia nemorosa*)

Bild 8. Honungsbi på gurkört (*Borago officinalis*)

Bild 9. Vallmo (*Papaver ssp.*)

BLOMMOR FÖR BIN – en sammanställning av olika örters attraktionsvärde för bin

Jordbruksverket vill med denna publikation öka kunskapen om växter för bin. I denna unika sammanställning med inte mindre än 528 nektar- och pollenproducerande örter kan du få viktig information om vilka arter som har störst betydelse för honungsbin och vilda bin. Därutöver finns även uppgifter om nektarutsöndring, potentiell honungsskörd, pollenfärg och pollenets proteininnehåll.

Intresset för bra foderväxter för honungsbin går långt tillbaka i tiden. En god tillgång på nektar- och pollenrika växter inom rimligt avstånd från bigården lägger grunden för en tillfredsställande yngelutveckling och en hög honungsskörd. Redan i mitten av 1900-talet sammanställde Pere Dugat från Frankrike de mest betydelsefulla dragväxternas honungspotential med egna observationer som underlag, inklusive uppgifter från andra källor. I Åke Hanssons bok *Bin och biodling* från 1980 graderas olika växters värde för honungsbin med en betygsskala från 0 till 4 för nektar- respektive pollenproduktion. Samma princip med siffergradering (eller antal stjärnor) används även i Danmark, Norge, Tyskland och Nederländerna. I Polen och en del andra forna öststater kalkylerar man med en teoretisk skörd per hektar baserat på växtens producerade volym nektar i kombination med nektarns sockerinnehåll. Uppgifterna om attraktionskraft på honungsbin och honungspotential för olika växter varierar stort mellan olika källor.

I denna sammanställning, som inkluderar 528 arter mer eller mindre betydelsefulla örter avseende nektar- och pollenproduktion, har jag försökt att väga samman olika uppgifter till ett uppslagsverk i tabellform. I sammanställningen redovisas växtens värde som nektar- och pollenleverantör primärt för honungsbin, men även attraktionskraften för humlor och solitärbin i de fall information finns tillgänglig. Dessutom uppges information om pollenfärg, pollenets proteinhalt, nektarproduktion per blomma, nektarns sockerhalt och potentiell honungsskörd per ytenhet. Jag vill poängtera att publikationen inte ska uppfattas som en rekommendation för vad som bör odlas, utan mer en värdering av olika växters värde som nektar- och pollenleverantörer. Sammanställningen inkluderar enbart örter och inga träd, buskar eller andra vedartade växter, men planen är att tabellerna kommer att kompletteras efterhand med dessa uppgifter.

Blommor och bin

Att blommor och pollinatörer drar ömsesidig nytta av varandra är sedan länge känt. Blommande växter och dess pollinatörer har samutvecklats genom historien och är beroende av varandra. Blommor har utvecklats tillsammans med pollinatörerna och pollinatörerna har anpassats för att tillse blommornas

behov. Vissa växtfamiljer, som till exempel ärtväxterna (Fabaceae), har djupa blommor och besöks främst av bin med långa tungor (till exempel vissa humlor), medan växtfamiljer med grunda blommor (exempelvis korgblommiga, Asteraceae) föredras av bin med korta tungor (till exempel solitärbin). De flesta vårblostande arter producerar i regel mer pollen och mindre nektar för att matcha det stora proteinbehov som råder när bisamhällen och vilda pollinatörer är under uppförökning. Sommarens blommor ger generellt mer nektar och relativt sett mindre pollen för att bina då behöver energi och bygga upp ett stort vinterförråd.

Ettåriga växter, annueller, kan producera betydande mängder pollen och nektar, men på grund av deras livscykel blommar de senare och kan generellt inte bidra till den tidiga yngelsättningen i samhället. Tvååriga växter och perenner har lagringsorgan som lökar, knölar eller kraftiga rötter som möjliggör en tidig tillväxt och blomning. Innan utvecklingen av lantbruket var vilda växter den enda födan för bin, men idag möjliggör ett flertal lantbruksgrödor (raps och vissa baljväxter) ett stort honungsöverskott på grund av massblomning på en begränsad yta. I slättlandskap med monokulturer utan nektarrika grödor är det ofta brist på foderresurser för både honungsbin och vildbin, medan landskap med större variation erbjuder en större mångfald av foderresurser kontinuerligt över säsongen. För flera grödor (till exempel fruktträd och baljväxter) är en god pollinering oundgänglig för frukt- eller frösättning, och bisamhällen eller lådhumlor flyttas till grödan för att göra binas flygsträcka så kort som möjligt.



Bild 1: Fält med honungsört (*Phacelia tanacetifolia*) ger ett stort nektar- och pollenöverskott till främst humlor och honungsbin.

Prydnadsväxter

Flertalet prydnadsväxter har medvetet förädlats för sina visuella egenskaper. Samtidigt har i många fall pollenproduktion och nektarutsöndring missgynnats, vilket bidragit till att många arter tappat sitt värde som dragväxt (till exempel Dahlia och Begonia). Begreppet dragväxt innefattar en biväxt som under en viss tid fullständigt dominerar som föredragen foderväxt hos bina, när de drar in näring till samhället.

Pollinering

De flesta växter innehåller blommor med både hanliga organ (ståndare) som producerar pollen, och honliga organ (pistiller), vilka är mottagare av pollen och producerar frö. Nektarierna sitter oftast i botten av blomman och producerar nektar. Växternas produktion av nektar och pollen lockar insekter att besöka blommorna som därmed blir pollinerade och därför medger växtens fortplantning. Växter är antingen själv-, vind- eller insektpollinerade eller en kombination av dessa. Med pollinering menas transporten av pollen från den hanliga delen (ståndare) till den honliga delen (märket på pistillen) i samma blomma eller en annan blomma. Vindpollinerade växtarter klarar av sin pollinering utan insekter men ibland kan resultatet förbättras med pollinerande insekter. Ungefär hälften av alla växtarter är självsterila. Det innebär att pollen från den egna plantan inte kan befrukta fröämnet, utan måste korspollineras, det vill säga få pollen från en annan planta, eller ibland till och med få pollen från en annan sort. Självsterila arter, som till exempel äpple och vitklöver, behöver korspollineras och sätter inte frö utan hjälp av pollinerande honungsbin, vilda bin eller andra pollinatörer.




Bild 2: *Tagetes* starkt förädlad med tillbakabildad blomma för ett åtråvärt prydnadsvärde. Värdet som biväxt försämras därmed.

Nektar och pollen

Ett honungsbisamhälle insamlar årligen 120–200 kg nektar och 10–55 kg pollen. Nektarn ger energi men innehåller även proteiner och aminosyror som försvar mot mikrobiell invasion. Pollen förser bina med proteiner, fett och mineraler vilka utgör grunden för yngelproduktionen i samhället. Brist på pollen leder till minskad yngelsättning. På grund av det stora pollen- och nektarbehovet är det betydelsefullt med god tillgång på lämpliga blommande växter under hela den aktiva yngelsäsongen. Under skandinaviska förhållanden är risken för brist störst tidigt på våren och under senare delen av sommaren.

Nektarproduktionens storlek är anpassad för att locka till sig pollinatörer, men är inte stor nog att fylla behovet hos ett bi genom att bara besöka en enda blomma. På så sätt kommer de pollinerande insekterna att besöka många blommor för att fylla sin honungsblåsa och därmed pollinera många blommor. När en blomma är uttömd på nektar kan biet känna av det och behöver inte slösa tid på att kontrollera om det finns något kvar; istället hastar det vidare till en annan blomma. Vid blombesöken fastnar också pollen på biets håriga kropp, varefter pollenet transporteras vidare med biet till nästa blomma. För honungsbin, humlor och vissa arter av solitärbin samlas sedan pollenet i deras ”pollenbyxor” på bakbenen för att transporteras hem till kupan eller boet. I kupan lagras sedan pollenet tillsammans med lite nektar i celler nära yngelnästet. Detta kallas för bibröd och har en lång hållbarhet genom att det sker en mjölksyrasjäsning när nektarn blandas med pollen. Den kemiska sammansättningen av pollenet varierar från växt till växt, men består huvudsakligen av en proteinhalt mellan 10 och 35 procent. För att pollenet ska vara värdefullt för bin bör det ha en proteinhalt som uppgår till minst 20 procent, men även sammansättningen av aminosyror i proteinet påverkar pollenets kvalitet för binas utveckling.



Bild 3: Blommande oxtunga (*Anchusa officinalis*).

Honungsbin

Honungsbin är i huvudsak blomtrogna, det vill säga, att de fortsätter att besöka samma växtart så länge den producerar tillräckligt med nektar eller pollen för att det ska vara lönsamt för bisamhället. När en bra födokälla har upptäckts kommuniceras detta ut till övriga intresserade i samhället genom att arbetarbin dansar i kupan. Genom dansen överförs information om vilken riktning och vilket avstånd det är till födokällan i förhållande till bikupan. Detta gör att fler bin kan tillgodogöra sig pollen eller nektar från den nya källan. Födokällans intensitet av nektarutsöndring i kombination med nektarns sockernehåll meddelas av spanarbiet genom bidansen.

Humlor

Till skillnad från honungsbin är humlor inte blomtrogna utan hämtar foder från flera arter under samma flygtur. Däremot finns en viss form av samarbete i ett humlesamhälle. Då humlor kommer hem efter en flygtur från goda födokällor, kan de genom sin doft från besökta blommor framkalla samlariver hos sina systrar. De humlor som lämnar boet förlitar sig då på doften för att finna arten att hämta pollen och nektar ifrån. Humlor kan även lära sig att känna igen färg och form och på så sätt effektivisera samlandet av mat.

Vissa solitärbin är specialister och besöker därmed ett begränsat urval av blommor.

Förklaring till de olika uppgifterna i tabellerna

Denna tabellsammanställning, som är bearbetad utifrån tillgänglig litteratur tillsammans med delvis egna observationer, bör betraktas som en vägledning. Geografiska och klimatologiska förhållanden kan påtagligt påverka angivna värden.

I sammanställningen ingår totalt 528 örter, antingen som arter eller grupperat som släkten. För varje art beskrivs blomningstiden med förkortningar av årstiden; vår, försommar, högsommar och så vidare, istället för att ange blomningstiden i månader. Detta på grund av att blomningstiden varierar mycket inom vårt avlånga land. Vidare klassificeras arterna beroende på hur betydelsefulla biväxterna är med fokus på honungsbin. Klassificeringen har baserats på uppgifter från en rad olika europeiska litteraturreferenser. Faktorer som påverkar klassificeringen är nektar- och pollenproduktion per ytenhet och generell attraktionskraft på honungsbin. Även förekomsten och betydelsen som dragväxt i det svenska landskapet och i vilken mån den påverkar honungsskörden inverkar på klassificeringen.

Klassificeringen eller betygssättningen omfattar en skala från 0 till 4. En växt med betyget 0 betyder att den inte utsöndrar någon nämnvärd nektar eller pollen. Betyget 1 motsvarar en växt som sällan besöks av honungsbin när det finns bättre källor i närheten. En 2:a avser växter som har en måttlig attraktions

förmåga medan en 3:a avser en god attraktionsförmåga, däri inbegripet en god nektar- och pollenproduktion. En 4:a i betyg har använts sparsamt och betecknar en enastående biväxt med stor honungs- eller pollenpotential. Nektarns sockerhalt varierar från en växtart till en annan och det är en kombination av nektarns sockerhalt i procent och dess utsöndringskapacitet i milliliter per blomma och tidsenhet, under gynnsamma väderförhållanden, som avgör i fall växten betraktas som mer eller mindre åtråvärd. Värdet som pollenleverantör bestäms genom hur mycket pollen som produceras per blomma, dock inte av pollenets proteinvärde. Majs levererar stora kvantiteter pollen (betyg 3) under sensommaren, men på grund av lågt proteininnehåll är växten generellt undermålig för samhällets yngelutveckling.

I förteckningen över arter anger jag även populariteten bland solitärbin samt kort- och långtungade humlor, i de fall uppgifter existerar i litteraturen. I tabell 2 med utökad information uppges växtens honungs- respektive pollenpotential i kg per hektar. Dessa data har sannolikt inte uppmätts i realiteten, utan är en beräkning utifrån blommans nektarutsöndring per tidsenhet, i kombination med nektarns sockerinnehåll kopplat till artens normala beståndstäthet. Dessa teoretiska beräkningar varierar ej sällan mellan olika författare och beror sannolikt på hur beståndets täthet har bestämts. I tabellerna anges därför dessa värden i intervall för att så långt det är möjligt täcka in flera litteraturreferenser. Olika växtarter avger merparten av pollen och nektar vid speciella tider under dagen och detta anges för de arter där uppgifter finns tillgängliga. I tabell 3 återfinns pollenets proteininnehåll för ett antal växtarter samlade.

Flera goda nektar- och pollenleverantörer är också klassade som invasiva arter i Sverige. En främmande invasiv art är en art som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada i vårt ekosystem. En förteckning över främmande invasiva arter finns utlagd på Artdatabankens hemsida. I denna sammanställning är de invasiva arterna markerade i en särskild kolumn med "Ja".

Litteraturreferenser

- Christensen F. 1984. Biplanteflora. L. Launsö, Ishøj, DK.
- Crane, E. 1951. Bee World 32(2): 12–14
- Dugat, P. 1949. Bull. Synd. Apic. 59(12) 279
- Hansson, Å. 1980. Bin och Biodling. LTs förlag, Stockholm.
- Hansson, Å. 1988. Biväxter som alternativgrödor. Sveriges biodlares riksförbund.
- Jablonski, B. & Koltowski, Z. 2001. Nectar secretion and honey potential of honey-plants growing under Poland's conditions – Part XII. J. of Apicultural Sc. Vol 45: 29–35.
- Jablonski, B. & Koltowski, Z. 2005. Nectar secretion and honey potential of honey-plants growing under Poland's conditions – Part XV. J. of Apicultural Sc. Vol 49: 59–63.
- Janssens, X., Brunneau, E. & Lebrun. 2006. Prevision des potentialites de prdouction de miel a l'echelle d'un rucher au moyen d'un système d'information géographique. Apidologie 37: 351–365.
- Kirkevold, R. R. & Gjessing, T. 2003. Den store biplanteboken.
- Kirk, W. D. J & F.N. Howes. 2012. Plants for bees. International Bee Research Association, U.K.
- Kirk, W.D.J. 2006. A colour guide o pollen loads of the honey bee. International Bee research Association (IBRA), Cardiff, UK.
- Liolios, V med flera. 2015. Ranking pollen from bee plants according to their protein contribution to honey bees. Journal of Apicultural Research Vol 54(5): 582–592.
- Mattsson C. arl-Otto. 2015. Bin till nytta och nöje. ARTCOPY
- Mossberg, B., Stenberg, L & Ericsson S. 1992. Den nordiska floran. Wahlström & Widstrand.
- Nepi, M., Soligo, C., Nocentini, D. Abate, M., Guarniere, M., Cai, G., Bibi, L., Puglia, M., Bianchi, L. & Pacini, E. 2012. Amino acids and protein profile in floral nectar: Much more than a simple reward. Flora – Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants. 207(7) 475–481.
- Pernal, S. & Currie, R. 2000. Pollen quality of fresh and 1-year-old pollen diets for worker honey bees (*Apis mellifera* L.). Apidologie 31: 387–409.
- Pritsch, G. 2018. Bienenweide – 220 Trachtpflanzen erkennen & Bewerten. Frankh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart.

- Rortais, A., Arnold, G., Halm, M. P., & Touffet-Briens, F. 2005. Modes of honey-bees exposure to systemic insecticides: estimated amounts of contaminated pollen and nectar consumed by different categories of bees. *Apidologie*, 36(1), 71–83.
- Salonen, A., Lavola, A., Virjamo, V. & Julkunen, T. 2021. Protein and phenolic content and antioxidant capacity of honey bee-collected unifloral pollen pellets from Finland. *Journal of Apicultural Research*
- Sommerville, D.C. 2001. Value of bee collected pollen. Rural Industries Research and Development Corporation No. 01/047.
- Sulborska, A. 2019. Rosliny Pozytkowe. Wydawnictwo BEE & HONEY Sp, Poland.
- Szczesna, T. 2006. Protein content and amino acids composition of bee-collected pollen originating from Poland, South Korea and China. *Journal of Apicultural Science* Vol. 50 (2): 91–99.
- <https://www.mybeeline.co/en/p/pollen-identification-color-guide>
- <https://alltombiodling.se/bivaxter/>
- https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/29.-artdatabankens-risklista/rapport_klassifisering_av_fram-mande_arter2.pdf
- <https://linneus.nrm.se/flora/welcome.html>

Blommor för bin – attraktionskraft och blomningstid

Förkortningar		Förkortningar	
tv	tidig vår	4	utmärkt värde
v	vår	3	högt värde
fs	försommar	2	måttligt värde
hs	högsommar	1	lågt värde
ss	sensommar	0	saknar betydelse
h	höst	-	saknar värde
		*	lågt värde
i.u.	ingen uppgift	**	måttligt värde
		***	högt värde

Tabell 1. Tabellen beskriver 528 arter/släkten med avseende på blomningstid, värde som nektar- och pollenleverantör för honungsbin (anges med 0 till 4). Därutöver finns uppgifter om artens värde för humlor och solitärbin (anges med *, ** eller ***). Invasiva främmande arter som finns med på Artdatabankens risklista benämns med "JA".

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade		
<i>Achillea millefolium</i>	röllika	hs-hö	1	1 (2)	**	*	***	
<i>Aconitum napellus</i>	äka stormhatt	hs-ss	1	1	*	**	-	
<i>Adonis vernalis</i>	våradonis	tv-v	0	2	*	*	*	
<i>Aegopodium podagraria</i>	kirskål	hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Agastache foeniculum</i>	anisisop	hs-th	3 (4)	1	*	*	*	
<i>Agastache rugosa</i>	koreansk anisisop	hs-ss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ageratum spp.</i>	agerater	hs-th	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Agrimonia eupatoria</i>	småborre	hs-ss	2	2	*	*	*	
<i>Ajuga pyramidalis</i>	blåsuga	v-fs	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ajuga reptans</i>	revsuga	v-hs	3	2	**	**	**	
<i>Alcea rosea</i>	stockros	hs-h	3	1	**	*	-	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	svalting	fs-ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Alliaria petiolata</i>	löktrav	v-fs	1	1	*	*	*	
<i>Allium cepa</i>	kepalök	hs	3	2	*	*	*	
<i>Allium giganteum</i>	jättelök	fs-hs	3	2	*	*	*	
<i>Allium oleraceum</i>	backlök	hs-ss	3	1	*	*	*	
<i>Allium porrum</i>	purjo	fs-hs	2	1	*	*	*	
<i>Allium schoenaprasum</i>	gräslök	fs	3	1	*	*	*	
<i>Allium ursinum</i>	ramslök	v-fs	3	1	*	*	*	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Althea officinalis</i>	läkemalva	hs–h	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Anchusa arvensis</i>	fårtunga	fs–hs	1	1	**	**	*	
<i>Anchusa officinalis</i>	oxtung	fs–hs	3	1	**	**	*	
<i>Anemone blanda</i>	balkansippa	v	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Anemone hepatica</i>	höstanemon	ss–h	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Anemone nemorosa</i>	vitsippa	v	0	2	*	*	*	
<i>Anemone pulsatilla</i>	backsippa	v	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Anethum graveolans</i>	dill	hs–h	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Angelica archangelica</i>	kvanne	hs–ss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Angelica sylvestris</i>	strätta	hs–ss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Anthemis tinctoria</i>	färgkulla	fs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Anthericum spp.</i>	sandliljesläktet	fs–hs	1	1	*	-	*	
<i>Anthyllus vulneraria</i>	getväppling	fs–hs	2(1)	2(1)	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Antirrhinum majus</i>	lejongap	fs–h	1	1	*	**	*	
<i>Antriscus silvestris</i>	hundkåx	fs–hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Apium graveolens</i>	selleri	hs	1	1	*	*	**	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	akleja	fs–hs	1	2	*	**	-	
<i>Arabis alpina</i>	fjälltrav	fs–hs	2 (3)	1	**	*	*	
<i>Arabis caucasica</i>	fagertrav	v–fs	2	1	**	*	*	Ja
<i>Arctium lappa</i>	stor kardborre	hs–ss	3	3	**	**	*	
<i>Arctium tomentosum</i>	ullkardborre	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Armeria maritima</i>	trift	v–fs/ss–h	2 (1)	1	**	**	**	
<i>Arnica montana</i>	slättergubbe	fs–hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Artemisia absinthium</i>	malört	hs–ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Artemisia lactiflora</i>	pärlemalört	ss–h	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Aruncus spp.</i>	plymspireor	hs	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Asclepias curassavica</i>	röd sidenört	hs–h	4	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Asclepias incarnata</i>	rosensideört	hs–h	4	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Asclepias syriaca</i>	sidenört	fs–hs	4	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Asclepias tuberosa</i>	orange sidenört	hs–ss	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Asparagus officinalis</i>	sparris	hs–ss	3	3	**	**	*	
<i>Astilbe chinensis</i>	plymstilbe	hs–ss	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Astragalus spp.</i>	vedelsläktet	fs–ss	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Astrantia major</i>	stjärnflocka	fs–ss	2	2	*	*	*	Ja
<i>Atropa belladonna</i>	belladonna	hs–ss	2	1	*	*	*	Ja
<i>Aubretia cultorum</i>	aubretia	v–fs	3 (1)	3	**	**	*	
<i>Aurinia saxatilis</i>	praktstenört	v–fs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja

Art		Blomningstid	Värde som honungsbitväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Ballota nigra</i>	bosyska	hs-ss	1	1	*	**	*	
<i>Baptisia spp.</i>	färgvåpplingsläktet	fs-ss	2	2	**	**	-	
<i>Barbarea vulgaris</i>	sommargyllen	v-fs	2	2	**	*	*	
<i>Begonia spp.</i>	begoniasläktet	fs-h	0	1	-	-	-	
<i>Bellis perennis</i>	tusensköna	tv-h	1 (0)	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Bergenia spp.</i>	bergenia	v-fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Berteroia incana</i>	sandvita	hs-h	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Bistorta officinalis</i>	stor ormrot	fs-hs	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Bistorta spp.</i>	ormrot	fs-hs	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Borago officinalis</i>	gurkört	hs-h	4	2	***	***	**	Ja
<i>Brassica napus</i>	vårraps	hs	4	4	***	***	**	
<i>Brassica napus</i>	höstraps	v-fs	4	4	***	***	**	
<i>Brassica oleracea</i>	kål (ätlig)	fs-h	4	3	**	**	*	
<i>Brassica oleracea</i> <i>var. gongylodes</i>	kålrabbi	fs-h	2	2	**	**	*	
<i>Brassica rapa</i>	vårrybs	fs-hs	3	3	***	***	**	
<i>Brassica rapa</i>	höstrybs	v-fs	3	3	***	***	**	
<i>Brassica rapa ssp. campestris</i>	åkerkål	fs-hs	3	3	**	**	*	
<i>Brunnera macrophylla</i>	kaukasisk förgätmigej	v-fs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Bryonia dioica</i>	röd hundrova	fs-h	2	1	*	*	***	Ja
<i>Buphtalmum salicifolium</i>	ljusöga	hs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Butomus umbellatus</i>	blomvass	fs-ss	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Calamintha nepeta</i>	stenkyndel	fs-h	2(3)	1(2)	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Calendula officinalis</i>	ringblomma	hs-ss	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Calistephus spp.</i>	sommaraster	ss-h	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Caltha palustris</i>	kabbeleka	v-fs	2	3	*	*	*	
<i>Calystegia sepium</i>	snårvinda	hs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Camassia spp.</i>	stjärnhyacintsläktet	fs	1	2	*	-	*	
<i>Camelina sativa</i>	oljedådra	hs-ss	2	0	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Campanula medium</i>	mariaklocka	hs	2	2	***	**	***	Ja
<i>Campanula poscharskyana</i>	stjärnklocka	fs-h	2	2	***	**	***	
<i>Campanula rapunculoides</i>	knölklocka	fs-h	2	2	***	**	***	Ja
<i>Campanula rotundifolia</i>	liten blåklocka	hs-h	2	2	***	**	***	
<i>Cannabis sativa</i>	hampa	h	0	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cardamine pratensis</i>	ängsbräsmå	v-fs	1	2	*	*	*	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbiväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Carduus crispus</i>	krustistel	hs–h	3	2	***	***	***	
<i>Carduus spp./ Cirsium spp.</i>	tistel	-	3	2	***	***	***	
<i>Carlina spp.</i>	småstilar	-	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Carpobrotus edulis</i>	gul middagsblomma	fs–hs	1	1	*	*	*	
<i>Carthamus tinctorius</i>	safflor	hs–h	3	2	**	**	**	
<i>Carum carvi</i>	brödkummin	v–fs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Centaurea cyanus</i>	blåklint	fs–ss	3 (4)	2	***	***	***	
<i>Centaurea jacea</i>	rödklint	hs–ss	3	2	***	***	***	
<i>Centaurea macrocephala</i>	gulklint	hs–ss	3	3	***	***	***	
<i>Centaurea montana</i>	bergklint	hs–ss	3	2	***	***	***	Ja
<i>Centaurea nigra</i>	svartklint	hs–ss	3	2	***	***	***	Ja
<i>Centaurea scabiosa</i>	väddklint	hs–ss	3 (4)	3	***	***	***	
<i>Centranthus spp.</i>	pipörtssläktet	hs–h	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cerastium tomentosum</i>	silverarv	v–fs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Cerinthe spp.</i>	vaxblomma	fs–ss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Chamerion angustifolium</i>	mjölke	hs–ss	3	3	***	***	*	
<i>Chellidonium majus</i>	skelört	fs–ss	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Chenopodium album</i>	svinmålla	fs–h	0	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Chinodoxa lucilae</i>	stor vårstjärna	tv–v	2	1	*	*	*	
<i>Chrysanthemum spp.</i>	krysantemumsläktet	-	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Chrysanthemum x grandifolium</i>	krysantemumhybrider	ss–h	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Chrysogonum virginianum</i>	guldstjärna	fs–hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cicerbita alpina</i>	torta	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cichorium endivia</i>	sydcikoria	hs–ss	2	2	**	**	*	
<i>Cichorium intybus</i>	cikoria	hs–ss	2	2	**	**	*	
<i>Cimicifuga spp.</i>	trolldruvesläktet	hs–ss	1	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cirsium arvense</i>	åkertistel	hs–h	3	2	***	***	***	
<i>Cirsium heterophyllum</i>	brudborste	hs–h	3	2	***	***	***	
<i>Cirsium oleraceum</i>	kåltistel	hs–h	4	2	***	***	***	
<i>Cirsium palustre</i>	kärrtistel	hs–h	3	2	***	***	***	
<i>Cirsium rivulare</i>	bäcktistel	hs–ss	3	2	***	***	***	
<i>Cirsium vulgare</i>	vägtistel	hs–h	3	2	***	***	***	
<i>Cistus spp.</i>	cistrosor	fs–hs	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	

Art		Blomningstid	Värde som honungsбивäxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Clarkia elegans</i>	elegant clarkia	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Clarkia unguiculata</i>	clarkia	hs–ss	2	1	*	*	*	
<i>Claytonia spp.</i>	vårskönor	fs–h	1	1	*	*	*	
<i>Cleome hassleriana</i>	paradisblomster	hs–h	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Clethra alnifolia</i>	konvaljbuske	ss–h	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Clinopodium spp.</i>	bergmyntor	hs–h	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Colchicum autumnale</i>	tidlösa (höstblommande)	ss–h	2	2	-	-	-	
<i>Colchicum vernum</i>	tidlösa (vårblommande)	tv	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Consolida regalis</i>	riddarsporre (ettårig)	hs–ss	1	1	**	***	-	
<i>Convallaria majalis</i>	liljekonvalj	fs	1	1	*	*	*	
<i>Convolvulus arvensis</i>	åkervinda	fs–h	2	2	*	*	*	
<i>Coreopsis spp.</i>	ögonblomsläktet	hs–ss	2	2	*	**	*	
<i>Coriandrum sativum</i>	koriander	fs–hs	4	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Corydalis cava</i>	hålnunneört	v	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Corydalis lutea</i>	gul nunneört	v–fs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Corydalis solida</i>	stor nunneört	v	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cosmos bipinnatus</i>	rosenskära	hs–h	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cosmos sulphureus</i>	gullskära	hs–h	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Crambe maritima</i>	strandkål	fs–hs	2	2	*	*	*	
<i>Crepis spp.</i>	kloffbbläktet	fs–h	1	2	*	*	***	
<i>Crocsmia spp.</i>	montbretiasläktet	hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Crocus vernus</i>	vårkrokus	tv	1	3	*	-	*	Ja
<i>Cryptotaenia japonica</i>	japansk persilja	ss–h	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cucumis melo</i>	melon	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cucumis sativus</i>	gurka	hs–ss	3	2	*	*	*	
<i>Cucurbita maxima</i>	jättepumpa	hs–ss	2	1	**	**	*	
<i>Cucurbita pepo</i>	pumpa, squash	hs–ss	2	2	**	**	*	
<i>Cucurbita spp.</i>	pumpasläktet	hs–ss	2	1	**	**	*	
<i>Cuscuta spp.</i>	snärjor	hs–h	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cymbalaria muralis</i>	murreva	hs–h	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Cynara cardunculus</i>	kardon	h	3	2	**	**	*	
<i>Cynoglossum officinale</i>	hundtunga	fs–hs	3	1	**	**	*	
<i>Dahlia cultorum</i>	dahlia	ss–h	1	3	**	**	*	
<i>Dahlia pinnata</i>	trädgårdsdahlia	ss–h	2	3	**	**	*	
<i>Darmera spp.</i>	sköldbräckor	v	1	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Daucus carota sativa</i>	morot	hs–ss	2	2	*	*	***	
<i>Delphinium hybridum</i>	riddarsporre (hybrid)	hs	1	1	**	***	-	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Delphinium spp.</i>	riddarsporre	hs	2	1	**	***	-	
<i>Dianthus spp.</i>	nejliksläktet	hs-h	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Dictamnus albus</i>	mose brinnande buske	fs-hs	3	2	*	*	-	
<i>Digitalis purpurea</i>	fingerborgsblomma	fs-hs	2	1	***	***	*	
<i>Dipsacus fullonum</i>	kardvädd	hs-ss	3	1	**	**	*	Ja
<i>Dipsacus sativus</i>	värvarkarda	hs-ss	3	1	**	**	*	
<i>Dipsacus spp.</i>	kardväddsläktet	hs-ss	3	1	**	**	*	
<i>Doronicum orientale</i>	gemsrot	v-fs	1	2	*	*	*	Ja
<i>Dracocephalum moldavica</i>	turkisk drakblomma	hs-ss	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Dracocephalum spp.</i>	drakblommor	hs-ss	2	1	*	*	*	
<i>Echinacea purpurea</i>	röd solhatt	hs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Echinocystis lobata</i>	taggreva	hs-h	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Echinops exaltatus</i>	grå bolltistel	hs-ss	3	2	**	**	**	Ja
<i>Echinops bannaticus</i>	blå bolltistel	hs-ss	3	2	**	**	**	Ja
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	vit bolltistel	hs-ss	3	2	**	**	**	Ja
<i>Echium vulgare</i>	blåeld	fs-ss	3 (4)	2	***	***	**	
<i>Elsholtzia ciliata</i>	kammynta	ss-h	2	2	*	*	*	
<i>Epilobium hirsutum</i>	rosendunört	hs-h	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Eranthis hyemalis</i>	vintergäck	tv	2	3	*	-	-	Ja
<i>Eremurus robustus</i>	jättestäpplilja	ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Erigeron annuus</i>	sommarbinka	hs	2	2	**	**	**	Ja
<i>Eriophorum vaginatum</i>	tuvull	tv-v	0	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Erodium spp.</i>	skatnävor	fs-ss	1	1	*	*	*	
<i>Eruca sativa</i>	senapskål	fs-hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Eryngium hybridum</i>	hybridmartorn	hs-ss	3	2	***	***	**	
<i>Eryngium planum</i>	rysk martorn	hs-ss	3 (4)	2	***	***	**	Ja
<i>Erysimum cheiri</i>	gyllenlak	fs-hs	2	2	**	**	*	Ja
<i>Eschscholzia californica</i>	sömntuta	fs-h	0	3	*	*	*	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	hampflockel	hs-h	3	2	**	**	*	
<i>Euphorbia spp.</i>	törelväxter	fs-h	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Euphrasia spp.</i>	ögontröstsläktet	fs-h	1	2	-	-	*	
<i>Fagopyrum esculentum</i>	bovete	hs-ss	3	2	*	*	*	
<i>Ficaria verna</i>	svalört	v	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Filipendula ulmaria</i>	älgräs	hs-ss	0	3	*	*	*	
<i>Foeniculum vulgare</i>	fänkål	hs-ss	3	2	*	*	**	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Fragaria x ananassa</i>	jordgubbe	fs	1	1	*	*	**	Ja
<i>Fragraria vesca</i>	smultron	fs	1	1	*	*	**	
<i>Fritillaria imperialis</i>	kejsarkrona	v-fs	2	2	*	*	*	Ja
<i>Fuchsia magellanica</i>	fuchsia	hs-h	2	2	*	**	-	
<i>Fumaria spp.</i>	jordrökar	fs-h	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Gagea lutea</i>	vårlök	v	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Gaillardia spp.</i>	kokardblomsläktet	hs-h	2	2	**	**	**	
<i>Galanthus nivalis</i>	snödroppe	tv	2	1	-	-	-	
<i>Galega officinalis</i>	getruta	fs-hs	3 (1)	3 (1)	**	**	*	
<i>Galeopsis spp.</i>	dånsläktet	hs-ss	1	1	*	**	*	
<i>Galium spp.</i>	måror	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Gazania spp.</i>	gazania-hybrider	fs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Gentiana spp.</i>	gentianasläktet	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Geranium phaeum</i>	brunnäva	fs-ss	3	2	**	**	**	Ja
<i>Geranium platypetalum</i>	kaukasusnäva	fs-hs	3	2	**	**	**	
<i>Geranium pratense</i>	ängsnäva	hs-ss	3	2	**	**	**	
<i>Geranium robertianum</i>	stinknäva	fs-h	3	1	**	**	**	
<i>Geranium sanguinum</i>	blodnäva	fs-hs	3	1	**	**	**	
<i>Geranium spp.</i>	nävesläktet	fs-ss	3	2	**	**	**	
<i>Geranium sylvaticum</i>	midsommarblomster	fs-hs	3	1	**	**	**	
<i>Geum rivale</i>	humleblomster	fs-hs	2	2	**	**	*	
<i>Gilia spp.</i>	gilior	hs-ss	1	2	*	*	*	
<i>Glaucium spp.</i>	hornvallmosläktet	hs-ss	0	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Glebionis spp.</i>	färgkragesläktet	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Glechoma hederacea</i>	jordreva	v-fs	2	1 (0)	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Godetia spp.</i>	clarkior	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Grindelia spp.</i>	grindelior	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Gypsophila paniculata</i>	brudslöja	hs-ss	1	1	*	-	*	
<i>Hebe spp.</i>	hebesläktet	fs-ss	2	2	**	**	*	
<i>Helenium autumnale</i>	solbrud	ss	3	4	**	*	*	
<i>Helianthemum spp.</i>	solvända	fs-hs	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Helianthus annuus</i>	solros	ss-h	2(3)	2(3)	**	**	**	
<i>Helianthus salicifolius</i>	skobandssolros	ss-h	2	2	**	**	**	
<i>Helianthus tuberosus</i>	jordärtskocka	ss-h	2	2	**	**	**	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbi växt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Heliopsis helianthoides</i>	dagöga	hs–h	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Heliotropium arborescens</i>	heliotrop	hs–h	2	1	*	*	*	
<i>Helleborus spp.</i>	julrossläktet	tv	2	3	*	–	*	
<i>Hemerocallis spp.</i>	dagliljor	fs–ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Hepatica nobilis</i>	blåsippa	v	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	jätteloka	hs–ss	2	2	**	*	***	Ja
<i>Heracleum persicum</i>	tromsöloka	fs–ss	2	2	**	*	***	Ja
<i>Heracleum sibiricum</i>	sibirisk björnloka	hs–ss	2	2	**	*	***	
<i>Heracleum sphondylium</i>	björnloka	hs–ss	2	1	**	*	***	
<i>Hesperis matronalis</i>	trädgårdsnattviol	fs–hs	1	1	*	*	*	
<i>Heuchera spp.</i>	alunrotsläktet	fs–hs	1	1	*	*	*	
<i>Hieracium spp.</i>	hökfibblesläktet	fs–ss	2	2	*	*	**	
<i>Hippocrepis comosa</i>	hästskoklöver	fs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Hosta spp.</i>	funkiasläktet	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Humulus lupulus</i>	humle	hs–ss	0	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	engelsk klockhyacint	fs	1	2	**	***	*	Ja
<i>Hyacinthus orientalis</i>	hyacint	v–fs	2	2	–	–	–	Ja
<i>Hylotelephium spectabile</i>	kinesisk kärleksört	ss–h	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Hyoscyamus niger</i>	bolmört	fs–ss	1	1	*	*	*	
<i>Hypericum maculatum</i>	fyrkantig johannesört	hs–ss	1	1	**	*	*	
<i>Hypericum perforatum</i>	äkta johannesört	hs–ss	1	3	**	*	*	
<i>Hypochaeris radicata</i>	rotfibbla	fs–ss	1	1	*	*	**	
<i>Hyssopus officinalis</i>	isop	hs–ss	4	1	**	**	*	Ja
<i>Iberis spp.</i>	iberisar	v–fs	1	1	*	*	*	
<i>Impatiens grandulifera</i>	jättebalsamin	ss	1(3)	1(3)	***	***	*	Ja
<i>Impatiens noli-tangere</i>	springkorn	hs–ss	1	1	***	***	*	
<i>Inula salicina</i>	krissla	hs–ss	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ipomoea spp.</i>	batatsläktet	hs–ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Iris pseudacorus</i>	svärdslija	fs–hs	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Isatis tinctoria</i>	vejde	fs–hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Jasione montana</i>	blåmunkar	fs–vss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Kitaibelia vitifolia</i>	balkanmalva	fs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Knautia arvensis</i>	åkervädd	fs–hs	2 (3)	1	***	***	***	
<i>Kniphofia spp.</i>	fackelliljesläktet	hs–ss	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lamium album</i>	vitplister	fs–ss	2	1	**	***	**	
<i>Lamium galeobdolon</i>	gulplister	v–fs	2	1	**	***	**	
<i>Lamium maculatum</i>	rosenplister	v–fs	2	1	**	***	**	Ja
<i>Lamium purpureum</i>	rödplister	v–h	2	1	**	***	**	
<i>Lampranthus spp.</i>	glansblomssläktet	fs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lathraea squamaria</i>	vättersos	v	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lathyrus pratensis</i>	gulvial	fs–hs	2	1	**	***	*	
<i>Lavandula angustifolia</i>	lavendel	hs–vss	3	1	***	***	**	Ja
<i>Lavandula spica</i>	bredbladig lavendel	hs–ss	3	1	***	***	**	
<i>Lavatera thuringiaca</i>	gråmalva	hs–ss	3	-	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lavatera trimestris</i>	sommarmalva	hs–ss	2	-	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Leontodon autumnalis</i>	höstfibbla	hs–ss	1	2	*	*	**	
<i>Leonurus cardiaca</i>	hjärtstilla	hs–ss	3 (4)	2	*	*	*	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	prästkraige	fs–hs	1	1	*	*	**	
<i>Leucojum vernum</i>	snöklöcka	v	0	2	-	-	-	Ja
<i>Levisticum officinale</i>	libbsticka	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Liatris spicata</i>	rosenstav	hs–ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ligularia dentata</i>	klippstånds	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Ligularia przewalskii</i>	spirstånds	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lilium spp.</i>	liljesläktet	fs–hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Limnanthes douglasii</i>	sumpört	fs–ss	2	1	**	*	*	
<i>Limonium vulgare</i>	marrisp	hs–ss	2	1	*	*	*	
<i>Linaria vulgaris</i>	gulsporre	hs–ss	2	1	*	**	*	
<i>Linum usitatissimum</i>	lin	hs	1	1	*	*	*	
<i>Lithospermum spp.</i>	färgväxlare	fs–hs	2	2	*	*	*	
<i>Lobelia erinus</i>	lobelia	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lobelia fulgens</i>	praktlobelia	hs–ss	2	0	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lobularia maritima</i>	strandkrassing	hs–h	2	1	*	*	*	Ja
<i>Lotus corniculatus</i>	käringtand	hs	2	1	***	***	***	
<i>Lunaria annua</i>	judaspenningar	v–fs	2	1	*	*	*	Ja

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Lupinus angustifolius</i>	blålupin	fs–hs	1	2	**	*	*	
<i>Lupinus luteus</i>	gullupin	fs–hs	1	2	**	*	*	
<i>Lupinus polyphyllus</i>	blomsterlupin	fs–hs	1	2	**	*	*	Ja
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	gökblomster	fs–hs	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Lycopus europaeus</i>	strandklo	fs–ss	1	1	*	*	*	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	strandlysing	hs–ss	0	0	-	-	***	
<i>Lythrum salicaria</i>	fackelblomster	hs–ss	3	2	*	**	*	
<i>Malope trifida</i>	praktmalva	hs–ss	2	1	**	**	*	
<i>Malva moschata</i>	myskmalva	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Malva neglecta</i>	skär kattost	fs–ss	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Malva sylvestris</i>	rödmalva	hs–ss	2	1 (0)	**	**	**	
<i>Marrubium vulgare</i>	kransborre	hs–ss	2 (3)	1	*	-	*	
<i>Matricaria chamomilla</i>	kamomill	hs–h	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Medicago lupulina</i>	humleusern	fs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Medicago sativa</i>	blålusern	hs–h	3	2	*	**	**	
<i>Melampyrum pratense</i>	ängskovall	fs–ss	2	1	*	**	*	
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	skogskovall	fs–ss	2	1	*	**	*	
<i>Melilotus albus</i>	vit sötväppling	hs–ss	4	3	***	***	**	
<i>Melilotus officinalis</i>	gul sötväppling	hs–ss	4	2	***	***	**	
<i>Melissa officinalis</i>	citronmeliss	hs–ss	2	1	*	**	*	
<i>Melittis melissophyllum</i>	honungsmynta	v–fs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Mentha longifolia</i>	gråmynta	ss–h	3 (4)	1	*	*	*	Ja
<i>Mentha x piperita</i>	pepparmynta	hs–ss	2	1	*	*	*	Ja
<i>Menyanthes trifoliata</i>	vattenklöver	fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Mimulus guttatus</i>	gyckelblomma	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Monarda didyma</i>	röd temynta	hs–ss	2	2	*	**	*	
<i>Muscaria armeniacum</i>	armenisk pärlhyacint	v–fs	2	2	*	*	*	Ja
<i>Muscaria botryoides</i>	pärlhyacint	v–fs	2	2	*	*	*	
<i>Myosotis spp.</i>	förgätmigejsläktet	fs–hs	2	1	**	**	**	
<i>Myrrhis odorata</i>	spansk körvel	v–fs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Narcissus poeticus</i>	pingstlilja	v–fs	1	2	*	*	*	
<i>Narthecium ossifragum</i>	myrlilja	hs–ss	1	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Nasturtium officinale</i>	källfräne	fs–hs	1	1	*	*	*	
<i>Nemophila menziesii</i>	prins gustafs öga	hs	3	1	*	*	*	
<i>Nepeta cataria</i>	kattmynta	hs–ss	3	1	**	***	**	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbiväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Nepeta faassenii</i>	kantnepeta	hs-ss	3	1	**	***	**	
<i>Nepeta nuda</i>	stäppnepeta	hs-ss	3 (4)	1	**	***	**	
<i>Nicotiana spp.</i>	Tobakssläktet	fs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Nigella damascena</i>	jungfrun i det gröna	hs-ss	3	2	*	*	-	
<i>Nigella sativa</i>	svartkummin	hs-ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Nuphar lutea</i>	gul näckros	fs-hs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Nymphaea alba</i>	vit näckros	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ocimum basilicum</i>	basilika	hs	2	1	**	**	**	
<i>Odontites vernus</i>	åkerrödtoppa	fs-hs	1	1	**	***	**	
<i>Oenothera biennis</i>	nattljus	fs-h	1	2	*	*	*	
<i>Oenothera lamarckiana</i>	nattljus	hs-ss	2	2	*	*	*	
<i>Omphalodes verna</i>	ormöga	v-fs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Onobrychis viciifolia</i>	esparsett	hs-ss	4	3	***	***	***	Ja
<i>Ononis spp.</i>	puktörnesläktet	hs-ss	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Onopordum acanthium</i>	ulltistel	hs-ss	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Origanum vulgare</i>	kungsmynta	hs-ss	4	2	**	***	**	
<i>Ornithogalum candicans</i>	kaphyacint	hs-ss	1	1	*	*	-	
<i>Ornithogalum spp.</i>	aftonstjärna	fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ornithopus sativus</i>	serradella	fs-hs	3	2	**	**	*	
<i>Orobanche spp</i>	snyltrötter	fs-hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Oxalis stricta</i>	klöveroxalis	hs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Paeonia spp.</i>	pionsläktet	fs-hs	2	2	*	*	*	
<i>Papaver orientale</i>	orientvallmo	fs-hs	0	3	**	*	**	Ja
<i>Papaver rhoeas</i>	kornvallmo	fs-hs	0	3	**	*	**	
<i>Pastinaca sativa</i>	palsternacka	hs	2	2	*	*	**	
<i>Patrinia spp.</i>	patriniasläktet	hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Pelargonium spp.</i>	pelargonsläktet	hs-ss	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Penstemon spp.</i>	penstemonsläktet	hs-ss	1	2	*	**	*	
<i>Perezia multiflora</i>	perezia		2	2	*	*	*	
<i>Perovskia atriplicifolia</i>	afghanperovskia	hs-ss	3	1	**	**	*	
<i>Petasites albus</i>	vitskråp	v	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Petasites frigidus</i>	fjällskråp	v	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Petasites hybridus</i>	pestskråp	v	3	2	**	**	**	
<i>Petrocallis spp.</i>	petrocallis	fs-ss	1	1	*	*	*	
<i>Petroselinium crispum</i>	persilja	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	honungsört	fs-ss	4	4	**	*	*	
<i>Phaseolus coccineus</i>	rosenböna	hs-ss	2	2	*	*	-	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbiväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Phlox drummondii</i>	höstflox	hs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Phlox subulata</i>	mossflox	fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Phuopsis stylosa</i>	bollmåra	fs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Physalis alkekengi</i>	judekørs	hs-ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Physostegia virginiana</i>	drakmynta	hs-ss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Phyteuma spp.</i>	rapunkler	fs-hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	bockrot	hs-ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Pisum sativum hortense</i>	ärt	fs-hs	1	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Plantago spp.</i>	grobladsväxter	fs-ss	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Platycodon grandiflorus</i>	praktklocka	hs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Polemonium coerulium</i>	blågull	fs-hs	3	3	**	**	*	
<i>Polygala vulgaris</i>	junfrulin	fs-ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Polygonatum odoratum</i>	getrams	fs	1	1	*	**	*	
<i>Polygonum bistorta</i>	stor ormrot	fs-hs	3	0	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Polygonum spp.</i>	trampörtssläktet	fs-ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Potentilla palustris</i>	kråklöver	fs-hs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Potentilla spp.</i>	fingerörtssläktet	fs-hs	1	2	*	-	*	
<i>Prenanthes spp.</i>	rödsallater	fs-hs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Primula spp.</i>	vivesläktet	v	0	1	*	*	*	
<i>Prunella vulgaris</i>	brunört	hs-ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Pulicaria dysenterica</i>	strandloppört	hs-ss	1	1	*	*	**	
<i>Pulmonaria obscura</i>	lungört	v-fs	1	1	**	***	**	
<i>Pulmonaria officinalis</i>	fläcklungört	v-fs	1	1	**	***	**	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	backsippa	v-fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Puschkinia scilloides</i>	porslinshyacint	v	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Pycnanthemum spp.</i>	pycnanthemumsläktet	hs-ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ranunculus acris</i>	smörblomma	fs-hs	1	1	-	-	*	
<i>Ranunculus ficaria</i>	svalört	v	1	2	-	-	*	
<i>Raphanus raphanistrum</i>	åkerrättika	hs-ss	3	2	***	***	**	
<i>Raphanus sativus</i>	rädisa	hs	3	2	***	***	**	
<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>	oljerrättika	hs	3	2	***	***	**	
<i>Reseda lutea</i>	gulreseda	hs-ss	3	2	**	*	***	
<i>Reseda luteola</i>	färgreseda	hs-ss	3	2	**	*	***	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Reseda odorata</i>	luktreseda	hs–ss	2	3	**	*	***	
<i>Reynoutria japonica</i>	parkslide	fs	3	0	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Reynoutria sachalinensis</i>	jätteslide	h	3	2	**	**	*	Ja
<i>Rheum spp.</i>	rabarber	fs	0	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Rhinanthus minor</i>	ängsskallra	fs–hs	1	0	**	**	*	
<i>Rhinanthus serotinus</i>	höskallra	fs–hs	1	0	**	**	*	
<i>Ricinus communis</i>	ricin	ss–h	1	1	*	*	*	
<i>Rodgersia spp.</i>	rodgersia	fs–hs	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Rosmarinus officinalis</i>	rosmarin	fs–hs	3	3	**	**	**	
<i>Rudbeckia hirta</i>	sträv rudbeckia	hs–h	2	3	**	**	**	
<i>Rudbeckia laciniata</i>	höstrudbeckia	ss–h	2	2	**	**	**	Ja
<i>Rumex spp.</i>	skräppor	hs–ss	0	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Ruta graveolens</i>	vinruta	hs–ss	3	3	*	-	-	
<i>Salvia lavandulifolia</i>	spansk salvia	fs–ss	3	1	**	**	*	
<i>Salvia nemorosa</i>	stäppsalia	fs–ss	4	1	**	**	*	Ja
<i>Salvia officinalis</i>	kryddsalvia	fs–ss	3	2	**	***	**	
<i>Salvia pratensis</i>	ängssalvia	fs–ss	3	1	**	**	*	
<i>Salvia sclarea</i>	muskatellsalvia	fs–ss	4	1	**	**	*	
<i>Salvia verticillata</i>	kranssalvia	fs–ss	4	2	**	**	*	
<i>Sanguinaria canadensis</i>	blodört	hs–h	1	1	*	*	*	
<i>Sanguisorba spp.</i>	pimpinellsläktet	fs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Saponaria officinalis</i>	såpnejlika	fs–hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Satureja hortensis</i>	sommarkyndel	hs–h	3	2	*	-	-	
<i>Satureja montana</i>	vinterkyndel	fs–ss	3	2	*	-	-	
<i>Saxifraga spp.</i>	bräckor	v–hs	1	1	-	-	*	
<i>Scabiosa columbaria</i>	fältvädd	hs–ss	2	1	***	***	***	
<i>Scilla amoena</i>	tuvig blåstjärna	v–fs	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Scilla spp.</i>	vårstjärnor	v	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Scilla verna</i>	norsk blåstjärna	v–fs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Scrophularia nodosa</i>	flenört	fs–hs	4	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Sedum acre</i>	gul fetknopp	fs–hs	3	2	**	**	**	
<i>Sedum album</i>	vit fetknopp	hs–ss	3	1	**	**	**	
<i>Sedum kamschaticum</i>	kamtjatka fetblad	fs–hs	3	2	**	**	**	
<i>Sedum spectabile</i>	kinesiskt kärleksört	hs–ss	3	2	**	**	**	
<i>Sedum spurium</i>	kaukasiskt fetblad	fs–hs	3	2	**	**	**	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbi växt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Sedum telephium</i> även <i>Hylotelephium</i> ..	kärleksört	ss–h	3	1	**	**	**	
<i>Sempervivum</i> spp	taklökssläktet	fs–ss	3	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Senecio jacobaea</i>	stånds	hs–ss	2	2	**	*	***	
<i>Senecio</i> spp.	korsörtssläktet	fs–h	2	2	**	**	**	
<i>Sherardia arvensis</i>	åkermadd	fs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Sicyos</i> spp.	hårgurkor	hs	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Sida cordifolia</i>	sammetsmalva	hs–ss	2	1	*	-	*	
<i>Sida hermaphrodita</i>	virginiamalva	hs–ss	2	2	*	-	*	
<i>Sidalcea malviflora</i>	röd axmalva	hs–ss	2	1	*	*	*	
<i>Silene dioica</i>	rödblåra	fs–hs	1	1	*	**	*	
<i>Silene flos-cuculi</i>	gökblomster	fs–hs	2	1	*	*	-	
<i>Silene vulgaris</i>	smällglim	fs–hs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Silphium perfoliatum</i>	skållört	hs–ss	4	4	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Silybum marianum</i>	mariatistel	hs–ss	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Sinapis alba</i>	vitsenap (-gul)	fs eller ss–h	3	3	***	***	**	
<i>Sinapis arvensis</i>	åkersenap	fs–h	3	3	***	***	**	
<i>Sisymbrium</i> spp.	gatsenaper	fs–ss	1 (3)	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Solanum</i> spp.	potatissläktet	fs–hs	0	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Solidago canadensis</i>	kanadensiskt gullris	ss–h	4	2	**	**	**	Ja
<i>Solidago gigantea</i>	höstgullris	ss–h	4	2	**	**	**	Ja
<i>Solidago virgaurea</i>	gullris	ss–h	3	2	**	**	**	
<i>Sonchus</i> spp	molkesläktet	ss	1	1	*	*	**	
<i>Spergula arvensis</i>	åkerspärgel	fs–ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Stachys byzantina</i>	lammörön	hs–ss	3	2	**	***	**	Ja
<i>Stachys officinalis</i>	humlesuga	hs–ss	3	1	**	***	**	
<i>Stachys palustris</i>	knölsyska	hs–ss	3	1	**	***	**	
<i>Stellaria media</i>	våtarv	v–h	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Stemmacantha</i> spp.	rabarberklintar	fs–hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Succisa pratensis</i>	ängsvädd	hs–ss	2	1	***	***	***	
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>)	höstaster	ss–h	2 (0)	3	**	**	***	Ja
<i>Symphyotrichum</i> spp.	höstastersläktet	ss–h	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Symphytum officinale</i>	äkta vallört	fs–hs	3	1	***	***	***	
<i>Tagetes patula</i>	sammetsblomster	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tagetes tenuifolia</i>	litet sammetsblomster	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tanacetum partheum</i>	matttram	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tanacetum vulgare</i>	renfana	ss	2	2	*	*	**	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbliväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Taraxacum vulgare</i>	maskros	v–fs	2	4	***	***	***	
<i>Tellima grandiflora</i>	anagrambräcka	fs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	Ja
<i>Teucrium spp.</i>	gamandrar	hs–ss	3	2	**	**	*	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	aklejruta	fs–hs	0	4	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Thalictrum delavayi</i>	violruta	hs	0	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Thlaspi arvense</i>	penningört	fs–ss	1	1	-	-	*	
<i>Thymus pannonicus</i>	ungersk timjan	fs–hs	3	2	**	**	**	
<i>Thymus pulegioides</i>	stortimjna	hs–ss	3	2	**	**	**	
<i>Thymus serpyllum</i>	backtimjan	hs–ss	3	1	**	**	**	
<i>Thymus vulgaris</i>	kryddtimjan	hs–ss	3	2	**	**	**	Ja
<i>Tiarella spp.</i>	spetsmössor	fs–hs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tithonia rotundifolia</i>	mexikansk solros	hs–h	1	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tradescantia X andersoniana</i>	tremastarblomma	fs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tragopogon pratense</i>	ängshaverot	fs–hs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tricyrtis spp.</i>	skuggliljesläktet	ss–h	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Trifolium alexandrinum</i>	alexandrinerklöver	hs–h	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Trifolium aureum</i>	gullklöver	hs–ss	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Trifolium campestre</i>	jordklöver	fs–ss	2	2	**	*	*	
<i>Trifolium dubium</i>	trädklöver	v–ss	3	2	**	*	*	
<i>Trifolium hybridum</i>	alsikeklöver	fs–ss	4	3	***	***	***	
<i>Trifolium incarnatum</i>	blodklöver	fs–h	3	3	***	***	*	
<i>Trifolium medium</i>	skogsklöver	fs–ss	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Trifolium montanum</i>	backklöver	fs–ss	3	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Trifolium pratense</i>	rödklöver	hs–ss	3	3	**	***	*	
<i>Trifolium repens</i>	vitklöver	fs–ss	4	2	***	***	**	
<i>Trifolium resipunatum</i>	doftklöver	ss–h	3	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Trifolium subterraneum</i>	subklöver	v–fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tripolium vulgare</i>	strandaster	hs–ss	1 (0)	2	**	**	***	
<i>Trollius spp.</i>	smörbollor	fs	2	3	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tropaeolum majus</i>	indiankrasse	hs–ss	2	2	*	*	*	
<i>Tulipa sylvestris</i>	vildtulpan	v–fs	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Tussilago farfara</i>	hästhov	v	2	3	**	**	**	
<i>Typha latifolia</i>	kaveldun	hs–ss	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Vaccaria hispanica</i>	åkernejlika	fs	1	1	*	*	-	
<i>Valeriana officinalis</i>	läkevänderot	hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	

Art		Blomningstid	Värde som honungsbiväxt		Värde för humlor		Värde för solitärbin	Invasiva arter
Vetenskapliga namn	Svenska namn		nektar	pollen	korttungade	långtungade	alla typer	
<i>Verbascum densiflorum</i>	ölandskungsljus	fs–ss	0	2	*	*	**	
<i>Verbascum thapsus</i>	kungsljus	hs–ss	0	2	*	*	**	
<i>Verbena hastata</i>	blåverbena	fs–ss	3	1	**	**	*	
<i>Verbesina alternifolia</i>	vingstam	ss–h	2	1	*	*	*	
<i>Veronica longifolia</i>	strandveronika	hs–ss	3	2	***	***	**	
<i>Veronica officinalis</i>	ärenpris	fs–hs	2	1	***	***	**	
<i>Veronica persica</i>	trädgårdsveronika	fs–ss	2	2	***	***	**	Ja
<i>Veronica spicata</i>	axveronika	hs–ss	2	2	***	***	**	
<i>Veronica teucrium</i>	praktveronika	fs–ss	3	2	***	***	**	
<i>Vicia cracca</i>	kråkvicker	fs–ss	3	1	***	***	**	
<i>Vicia faba</i>	åkerböna (bondböna)	hs	2	2	***	***	***	
<i>Vicia sativa</i>	fodervicker	fs–ss	2	1	***	***	**	
<i>Vicia sepium</i>	häckvicker	fs–ss	2	1	***	***	**	
<i>Vicia villosa</i>	luddvicker	fs–hs	2	1	***	***	**	
<i>Vincetoxum hinduriana</i>	tulkört	hs–ss	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Viola canina</i>	ängsviol	v–fs	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Viola odorata</i>	luktvio	tv–v	1	1	*	*	*	
<i>Viola tricolor</i>	styvmorsviol	tv–v	1	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Viscaria vulgaris</i> (syn. <i>Lychnis viscaria</i>)	tjärblomster	fs–hs	2	1	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Waldsteinia spp.</i>	waldsteiniasläktet	v–fs	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	
<i>Zea mays</i>	majs	ss	0	3	-	-	-	
<i>Zinnia elegans</i>	praktzinnia	hs–ss	2	2	i.u.	i.u.	i.u.	

Blommor för bin – tilläggsinformation

Tabell 2. Tabellen beskriver 299 arter/släkter med avseende på pollenfärg, potentiell honungs- och pollenskörd, nektarundsöndringskapacitet, nektarns sockerhalt och tidpunkt respektive optimal temperatur för artens nektarutsöndring.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/dygn)	%	
<i>Achillea millefolium</i>	rölleka	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Adonis vernalis</i>	våradonis	citrongul	0	6-10	i.u.	i.u.	i.u.	10:00–12:00/ minst 10° (optimalt 15-18°)
<i>Agastache foeniculum</i>	anisisop	gräddvit	400–900 (>1300)	160	0,3–0,5		35–70	i.u.
<i>Ageratum houstonianum</i>	leverbalsam	blekgul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Ajuga reptans</i>	revsuga	gul	80–150	i.u.	i.u.	0,5–1,5	46	i.u.
<i>Alcea rosea</i>	stockros	-	100–250	0	i.u.	1,45	20	i.u.
<i>Alliaria petiolata</i>	lökrav	i.u.	50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Allium cepa</i>	kepalök	gräddvit	50–185	i.u.	0,2–1,0	i.u.	40–65	i.u.
<i>Allium giganteum</i>	jättelök	violett	i.u.	i.u.	3,3–4,1	i.u.	38–73	i.u.
<i>Allium schoenaprasum</i>	gräslök	gröngul	i.u.	i.u.	1,16	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Allium ursinum</i>	ramslök	brun	45–80	i.u.	i.u.	0,14–0,25	50	morgon
<i>Althea officinalis</i>	läkemalva	mörkviolett	50–150	i.u.	3,0–6,0	i.u.	30–50	i.u.
<i>Anchusa officinalis</i>	oxtung	gulbrun	135–400	30	0,3–0,8	i.u.	40–60	i.u.
<i>Anemone huphenensis</i>	höstanemon	ljusgul	0	10–280	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Anemone nemorosa</i>	vitsippa	grönt krämvit	0	4–21	i.u.	i.u.	i.u.	10:00–16:00
<i>Angelica archangelica</i>	kvanne	grågul	60–300	i.u.	0,2–0,4	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Angelica sylvestris</i>	strätta	gul	80–250	10–16	i.u.	i.u.	15–65	10:00–14:00/ värmekrävande
<i>Anthemis tinctoria</i>	färgkulla	brunorange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Anthyllis vulneraria</i>	getvåppling	grå	50–70	i.u.	0,05–0,2	0,1–0,2	i.u.	i.u.
<i>Antriscus silvestris</i>	hundkåx	i.u.	25	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Arabis alpina</i>	fjälltrav	blekt olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Arabis caucasica</i>	fagertrav	gul	i.u.	3	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Arctium lappa</i>	stor kardborre	gräddvit	100–120	14–240	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Arctium tomentosum</i>	ullkardborre	gräddvit	100–120	14–155	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Asclepias incarnata</i>	rosensideört	-	200–500	0	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Asclepias syriaca</i>	sidenört	-	400–900	0	1,1–10,5	2,0–2,5	30–70	8–12:00/ 14–17:00/temp. 28–32°

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommas livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/ dygn)	%	
<i>Asclepias tuberosa</i>	orange sidenört	i.u.	ca 250	i.u.	1,1–2,0	i.u.	40–60	i.u.
<i>Asparagus officinalis</i>	sparris	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Asphodelus albus</i>	afodill	gul	i.u.	i.u.	4,2–4,9	i.u.	34–44	10:00-12:00
<i>Astrantia major</i>	stjärnflocka	brun	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Atropa belladonna</i>	belladonna	blekt olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Aubretia cultorum</i>	aubretia	grågrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Aurinaria saxatilis</i>	praktstenört	gul	i.u.	3,5	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Berteroa incana</i>	sandvita	olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Bistorta officinalis</i>	stor ormrot	i.u.	350	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Borago officinalis</i>	gurkört	gräddvit	100–250	90	2,0–6,0	0,4–3,5	25–65	efter-middag/23–30°
<i>Brassica campestris</i>	tatsoikål	i.u.	45–71	i.u.	i.u.	0,12–0,27	30–70	i.u.
<i>Brassica napus</i>	våraps	gul	60–80	80–240	0,4	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Brassica napus</i>	höstraps	gul	70–220	80–240	0,4–1,0	i.u.	20–55	10:00–12:00/ cirka 20°
<i>Brassica nigra</i>	svartsenap	i.u.	ca 100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Brassica oleracea</i>	kål (ätlig)	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	56	i.u.
<i>Brassica oleracea var. gongylodes</i>	kålrambetti	gul	120–170	i.u.	i.u.	0,88–1,02	31	i.u.
<i>Brassica rapa</i>	rybs, rova	ljusgul	32–60	i.u.	i.u.	i.u.	16–52	i.u.
<i>Bryonia dioica</i>	röd hundrova	ljus orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Calendula officinalis</i>	ringblomma	orange	uppg saknas	70–100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Caltha palustris</i>	kabbeleka	gul	15	10–30	i.u.	0,2	44	i.u.
<i>Calystegia sepium</i>	snärvinda	gräddvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Campanula carpatica</i>	karpaterklocka	brungrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Campanula medium</i>	mariaklocka	i.u.	150–400	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Campanula persicifolia</i>	stor blåklocka	brunt ljusgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cardamine pratensis</i>	ängsbrämma	i.u.	50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Carduus spp./ Cirsium spp.</i>	tistel	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Centaurea cyanus</i>	blåklint	gult gräddvit	60–350	10–95	0,2–0,4	i.u.	30–60	i.u.
<i>Centaurea jacea</i>	rödklint	ljus brungrön	100–230	i.u.	0,05–0,61	i.u.	20–77	i.u.
<i>Centaurea macrocephala</i>	gulklint	gul	230	110–360	1,3	i.u.	40	i.u.
<i>Centaurea montana</i>	bergklint	mörkgrå	200–300	70	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Centaurea nigra</i>	svartklint	gult gräddvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommandans livstid (mg socker)	dygnsproduktion per blomma (mg socker/dygn)	%	
<i>Centaurea scabiosa</i>	väddklint	gult gräddvit	500–600	200–280	0,72	i.u.	50–70	i.u.
<i>Chamerion angustifolium</i>	mjölkört	mörkt grönbå	170–250	80–110	0,6–0,95	i.u.	50	efter-middag/24–28°
<i>Chelidonium majus</i>	skelört	ljusgul-guldgul	0	120	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Chinodoxa sardensis</i>	liten vårstjärna	ljus gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Chinodoxa forbesii</i>	vårstjärna	ljus orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Chrysanthemum segetum</i>	gullkrage	tegelorange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cimicifuga rubifolia</i>	spjutsilverax	ljus brungrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cichorium intybus</i>	cikoria	vit-gräddvit	30–100	10–170	0,05	i.u.	i.u.	8:00–11:00
<i>Cirsium arvense</i>	åkertistel	ljus olivgrön	200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cirsium oleraceum</i>	kåltistel	ljusgrå	500–600	i.u.	0,8	i.u.	40–70	i.u.
<i>Cirsium rivulare</i>	bäcktistel	gräddvit	80	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Clarkia elegans</i>	elegant clarkia	violett	120–130	i.u.	i.u.	0,59–0,65	i.u.	i.u.
<i>Colchicum autumnale</i>	tidlösa (höstblommande)	i.u.	25–30	i.u.	0,65	i.u.	30	i.u.
<i>Convolvulus spp.</i>	vindesläktet	i.u.	50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Convolvulus arvensis</i>	åkervinda	gult gräddvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Coriandrum sativum</i>	koriander	rödviolett	60–300	110–170	0,1	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Corydalis cava</i>	hålnunneört	ljusgul	ca 6	2	0,8	i.u.	54	11:00–12:00
<i>Corydalis solida</i>	stor nunneört	ljusgul	ca 6,5	4	0,7	i.u.	33	i.u.
<i>Cosmos bipinnatus</i>	rosenskära	brandgul	i.u.	120	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cosmos sulphureus</i>	gullskära	orangegul	i.u.	130	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Crepis spp.</i>	klofibblesläktet	orangegul	50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Crocus vernus</i>	vårkrokus	brandgul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	11:00–15:00
<i>Cucumis melo</i>	melon	blekgul	15–20	i.u.	i.u.	0,5–0,7	i.u.	i.u.
<i>Cucumis sativus</i>	gurka	blekgul	30	i.u.	i.u.	0,98	31	i.u.
<i>Cucurbita maxima</i>	jättepumpa	gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cucurbita pepo</i>	pumpa	gul	30–40	i.u.	i.u.	19,7	16–65	i.u.
<i>Cucurbita pepo</i>	squash (zucchini)	gul	30–40	i.u.	i.u.	19,7	16–65	i.u.
<i>Cynara cardunculus</i>	kardon	blekt gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Cynoglossum officinale</i>	hundtunga	i.u.	130-180	i.u.	i.u.	1,33	36–65	i.u.
<i>Dahlia pinnata</i>	trädgårdsdahlia	orangegul	18–190	600	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Darmera peltata</i>	sköldbräcka	gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Daucus carota sativa</i>	morot	blekgul	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Dictamnus albus</i>	mose brinnande buske	smutsgult/ gråblå	150–200	13–20	4,6	i.u.	48	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/dygn)	%	
<i>Digitalis purpurea</i>	fingerborgsblomma	grågul	180–200	10–30	1,8–10	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Dipdacus sativus</i>	vävarcarda	gräddvit	300	300	0,07–0,88	i.u.	25–70	i.u.
<i>Dipsacus fullonum</i>	kardvädd	rosa	300–400	250	0,2–0,9	i.u.	30–70	i.u.
<i>Dracocephalum moldavica</i>	turkisk drakblomma	vit	200–490 (650)	i.u.	0,7–0,9	i.u.	36–62	12:00–14:00
<i>Echinacea purpurea</i>	röd solhatt	gul	190	100	0,3–0,6	i.u.	40–70	i.u.
<i>Echinocystis lobata</i>	taggreva	i.u.	190	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Echinops exaltatus</i>	grå bolltistel	gräddvit	150–500	ca 100	0,9–6,5	i.u.	30–70	i.u.
<i>Echinops ritro</i>	blå bolltistel	grönt gräddvit	470	60	4–5,5	i.u.	30–70	i.u.
<i>Echinops ritro ssp. ruthenicus</i>	rutensk bolltistel	i.u.	220	i.u.	1,2–3,3	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	vit bolltistel	gräddvit	400–800	150–250	0,9–6,5	i.u.	30–70	7:00–14:00
<i>Echium creticum</i>	kretansk blåeld	i.u.	400–600	i.u.	0,7–1,5	i.u.	25–50	i.u.
<i>Echium vulgare</i>	blåeld	mörkblå	200–400	60–100	0,7–1,5	i.u.	48	11–15:00
<i>Epilobium hirsutum</i>	rosendunört	gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Eranthis hyemalis</i>	vintergäck	ljusgul	23	17	0,88	i.u.	72	10:00–12:00
<i>Eremurus robustus</i>	jätttestäpplilja	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Eruca vesicaria ssp. sativa</i>	äka senapskål	i.u.	85–125	i.u.	i.u.	i.u.	36–56	i.u.
<i>Eryngium planum</i>	rysk martorn	gräddvit	300–900	30–180	0,2–0,7	i.u.	40–60	i.u.
<i>Erysimum cheiri</i>	gyllenlak	olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Eschscholzia californica</i>	sömmtuta	ljus orange	0	380	i.u.	i.u.	i.u.	7:00–16:00
<i>Eupatorium cannabinum</i>	hampflockel	vitgrå	140–190	i.u.	0,04	0,48–0,56	i.u.	10:00–14:00
<i>Fagopyrum esculentum</i>	bovete	grågul	80–300	150–300	0,15–0,20	i.u.	20–45	morgon-förmiddag/ max 25°
<i>Filipendula ulmaria</i>	älggräs	gul	0	120	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Fragaria x ananassa</i>	jordgubbe	gul	3–10	2–10	0,5–1,2	i.u.	20–45	11:00–12:00
<i>Fragraria vesca</i>	smultron	gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	26–31	i.u.
<i>Galanthus nivalis</i>	snödroppe	rödorange	50	1,3	0,36–0,69	i.u.	16–37	i.u.
<i>Galega officinalis</i>	getruta	orange	100–500	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Galeopsis tetrahit</i>	pipdån	gul	40–50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Galium odoratum</i>	myskmdra	i.u.	50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Gazania spp.</i>	gazania-hybrider	rödorange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Geranium platypetalum</i>	kaukasusnäva	gräddvit	110–140	22	0,8	i.u.	66	10:00–14:00
<i>Geranium pratense</i>	ängsnäva	i.u.	30–100	i.u.	i.u.	0,31–0,36	57–71	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/dygn)	%	
<i>Geranium sanguinum</i>	blodnäva	mörkt blågrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Geum rivale</i>	humleblomster	ljusgrön	70–150	i.u.	i.u.	2,4	i.u.	i.u.
<i>Glechoma hederacea</i>	jordreva	i.u.	200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Helenium autumnale</i>	solbrud	gulorange	450	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Helianthemum spp.</i>	solvända	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Helianthus annuus</i>	solros	gulbrun	40–50	35–65	0,2–0,8	i.u.	45–70	11:00–14:00
<i>Heliotropium arborescens</i>	heliotrop	grönt krämvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Helleborus spp.</i>	julrossläktet	blekt gul	i.u.	2–46	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Hepatica nobilis</i>	blåsippa	vitaktig	0	2	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	jätteloka	i.u.	80–150	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	bredloka	smutsgul	0–300	i.u.	0,5	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Heracleum sphondylium</i>	björnloka	gul	200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	spansk klockhyacint	gult olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Hyacinthus orientalis</i>	hyacint	beroende av blommans färg	i.u.	i.u.	0,49	i.u.	19	i.u.
<i>Hylotelephium spectabile</i>	kinesisk kärleksört	gul	90–220	i.u.	0,03–0,7	i.u.	30–80	middagstid
<i>Hypericum perforatum</i>	äkta johannesört	mörkgul	-	30–100	i.u.	i.u.	i.u.	6:00–20:00
<i>Hyssopus officinalis</i>	isop	grönt gräddvit	170–300	45	i.u.	0,05–0,27	20–70	i.u.
<i>Impatiens grandulifera</i>	jättebalsamin	vit	250–700	400–600	0,8–18	i.u.	58	i.u.
<i>Inula salicina</i>	krissla	klargul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Isatis tinctoria</i>	vejde	gul	70–85	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	10:00–14:00
<i>Jasione montana</i>	blåmunk	rosalila	160	i.u.	20–70	ca 0,11	i.u.	10:00–13:00 (pollen)
<i>Knautia arvensis</i>	åkervädd	blekt rosa	30–270	50	0,4–0,8	i.u.	30–70	eftermiddag
<i>Lamium album</i>	vitplister	gul	100–200	20–60	1,3	i.u.	30–50	i.u.
<i>Lamium galeobdolon</i>	gulplister	gul	15–20	i.u.	i.u.	i.u.	34	i.u.
<i>Lamium maculatum</i>	rosenplister	i.u.	95	i.u.	i.u.	i.u.	56	i.u.
<i>Lamium purpureum</i>	rödplister	röd	60	i.u.	i.u.	0,17	45	i.u.
<i>Lathyrus pratensis</i>	gulvial	i.u.	20–70	i.u.	2,3–2,8	i.u.	i.u.	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommas livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/ dygn)	%	
<i>Lavandula angustifolia</i>	lavendel	orange	190–300	15	i.u.	0,27–0,66	33–59	9:00–15:00/ 19–29°
<i>Lavandula spica</i>	bredbladig lavendel	i.u.	70–200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Lavatera thuringiaca</i>	gråmalva	i.u.	100–200	i.u.	4,0–5,0	i.u.	25–60	i.u.
<i>Lavatera trimestris</i>	sommarmalva	i.u.	13–60	i.u.	0,8–1,5	i.u.	22–38	i.u.
<i>Leontodon spp.</i>	lejonfibblesläktet	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	7–45	i.u.
<i>Leonurus cardiaca</i>	hjärtstilla	gult	200–500	40–45	0,5–1,0	i.u.	30–60	12:00–16:00/ cirka 30°
<i>Leucanthemum vulgare</i>	prästkrag	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Leucojum vernum</i>	snöklöcka	orange	i.u.	4	i.u.	i.u.	i.u.	9:00–13:00
<i>Levisticum officinale</i>	libbsticka	beige	300–550	35	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Liatris spicata</i>	rosenstav	grönt krämvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Ligularia dentata</i>	klippstånds	gulorange	170	70	0,4	i.u.	28–38	9:00–14:00
<i>Ligularia przewalskii</i>	spirstånds	gulorange	uppg saknas	15	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Limnanthes douglasii</i>	sumpört	gult olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Linaria vulgaris</i>	gulsporre	gulbrun	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Linum usitatissimum</i>	lin	i.u.	5–25	i.u.	i.u.	i.u.	26–49	i.u.
<i>Lobelia erinus</i>	lobelia	grönbrun	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Lotus corniculatus</i>	käringtand	ljus gråbrun	20–80	i.u.	0,05–0,4	i.u.	13–66	11:00–16:00/ 25–28°
<i>Lupinus angustifolius</i>	blålupin	brun	10–35	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Lupinus polyphyllus</i>	blomsterlupin	rosa	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Lupinus luteus</i>	gullupin	i.u.	26	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Lythrium salicaria</i>	fackelblomster	olivgrön/ blekgul	200–300	30–40	0,28	i.u.	40–70	9:00–15:00 (pollen)
<i>Malva sylvestris</i>	rödmalva	-	2–160	0	0,5–2,0	i.u.	30–65	12:00–16:00
<i>Marrubium vulgare</i>	kransborre	i.u.	400	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Medicago lupulina</i>	humlelusern	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Medicago sativa</i>	blålusern	gröngul	25–270	80–320	0,2–0,4	i.u.	20–60	10:00–12:00/ värmekrävande
<i>Melilotus albus</i>	vit sötväppling	orangebrun	200–800	40–170	0,03–0,16	i.u.	35–60	eftermiddagen/ värmekrävande
<i>Melilotus officinalis</i>	gul sötväppling	orangebrun	100–300	7–30	i.u.	i.u.	i.u.	värmekrävande
<i>Melissa officinalis</i>	citronmeliss	gräddvit	40–130	i.u.	i.u.	2	19–62	värmekrävande
<i>Melittis melissophyllum</i>	honungsmynta	vit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Mentha aquatica</i>	vattenmynta	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/ dygn)	%	
<i>Mentha arvensis</i>	åkermynta	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Mentha longifolia</i>	gråmynta	i.u.	400–750	6–18	0,15	i.u.	60–70	i.u.
<i>Mentha x piperita</i>	pepparmynta	i.u.	100–200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	27–30°
<i>Muscaria armeniacum</i>	armenisk pärlhyacint	olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Muscaria botryoides</i>	pärlhyacint	blå/vit	i.u.	2–43	0,4–0,6	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Myosotis spp.</i>	förgätmigejsläktet	gul-gulorange	6	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Nepeta cataria</i>	kattmynta	gräddvit	100–200	1–15	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Nepeta faassenii</i>	kantnepeta	vit	100–200	1–13	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Nepeta nuda</i>	stäppnepeta	i.u.	600–900	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Nicotiana spp.</i>	tobakssläktet	blekt gulvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	52	i.u.
<i>Nigella damascena</i>	jungfrun i det gröna	gulorange	45	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Nigella sativa</i>	svartkummin	ljusgul	10–25	i.u.	0,6–14	i.u.	20–77	9:30–12:30
<i>Nuphar lutea</i>	gul näckros	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	41	i.u.
<i>Nymphaea alba</i>	vit näckros	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	55	i.u.
<i>Ocimum basilicum</i>	basilika	gräddvit	100–130	i.u.	0,24–0,96	i.u.	30–70	9:00–14:00
<i>Oenothera biennis</i>	nattljus	gul	40	220	i.u.	i.u.	1,25–1,5	endast morgon (pollen)
<i>Onobrychis viciifolia</i>	esparsett	brun-brungrå	50–200 (400–600)	50–70	0,4–0,7	i.u.	45	i.u.
<i>Onopordum acanthium</i>	ulltistel	gräddvit	110	35	0,2–0,3	i.u.	20–50	i.u.
<i>Origanum vulgare</i>	kungsmynta	olivgrön	100–500 (900)	i.u.	i.u.	1,08	30–76	i.u.
<i>Ornithopus sativus</i>	serradella	vit	20–50	i.u.	0,02	i.u.	30–70	middagstid
<i>Paeonia spp.</i>	pionsläktet	gul	i.u.	19–69	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Papaver orientale</i>	orientvallmo	svart-blåsvart	0	280	i.u.	i.u.	i.u.	6:00–13:00
<i>Papaver rhoeas</i>	kornvallmo	svart-brunsvart	0	400	i.u.	i.u.	i.u.	5:30–10:00
<i>Pelargonium hortorum</i>	zonalpelargon	rödrosa	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Penstemon spp.</i>	penstemonsläktet	ljus olivgrön	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Petasites hybridus</i>	pestskräp	vit	i.u.	7	i.u.	i.u.	i.u.	9:00–16:00 (optimum 11:00)
<i>Phacelia campanularia</i>	klockfacelia	grönt gräddvit	40–70	i.u.	0,3–2,3	i.u.	4–44	i.u.
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	honungsört	blå–marin lila	240–480 (1000)	180–300	2,0–2,5	0,2–0,8	30–60	11:00–16:00/ 16–24°
<i>Phaseolus coccineus</i>	rosenböna	gul	60–320	10–25	1,9–6,4	i.u.	25–45	i.u.
<i>Physostegia virginiana</i>	drakmynta	i.u.	460	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/dygn)	%	
<i>Polemonium coerulium</i>	blågull	ljus gulorange	60–180	80	1,1–1,9	i.u.	30–50	i.u.
<i>Polygonum bistorta</i>	stor ormrot	vitgrå	40–350	40	i.u.	i.u.	20–60	i.u.
<i>Reynoutria japonica</i>	parkslide	i.u.	200–350	i.u.	0,3–0,4	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Reynoutria sachalinensis</i>	jätteslide	i.u.	320	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Plantago spp.</i>	grobladsväxter	blekgul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Polygonum spp.</i>	trampörtssläktet	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Prunella vulgaris</i>	brunört	gul	120	i.u.	0,1–0,7	i.u.	16–68	i.u.
<i>Pulmonaria obscura</i>	lungört	ljusgul	35–40	i.u.	i.u.	0,3–0,9	30	i.u.
<i>Pulmonaria officinalis</i>	fläcklungört	ljusgul	35–60	i.u.	i.u.	0,4–0,45	32	i.u.
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	backsippa	gul	i.u.	40–50	i.u.	i.u.	i.u.	8:00–15:00/10–15°
<i>Ranunculus acris</i>	smörblomma	grönt gulorange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Ranunculus ficaria</i>	svalört	gulorange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Raphanus raphanistrum</i>	åkerrättika	blekt gulgrön	30–50	40–90	0,9–1,15	i.u.	50–60	i.u.
<i>Raphanus sativus</i>	rädisa	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	31	i.u.
<i>Reseda lutea</i>	gulreseda	gul	200	60	0,12–0,45	i.u.	30–70	12:00–17:00
<i>Reseda odorata</i>	luktreseda	tegelorange	110	150	0,13–0,44	i.u.	35–70	12:00–17:00
<i>Rosa multiflora</i>	japansk klätterros	organgebrun	0	170–500	i.u.	i.u.	i.u.	9:00–11:00
<i>Rosmarinus officinalis</i>	rosmarin	i.u.	200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Rudbeckia fulgida</i>	praktrudbeckia	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Ruta graveolens</i>	vinruta	gul	400–450	300	3–5	i.u.	55–70	i.u.
<i>Salvia nemorosa</i>	stäppsalia	i.u.	190–600	i.u.	i.u.	1,16	20–66	i.u.
<i>Salvia officinalis</i>	kryddsalvia	grågul	100–370	40	1–3	0,47–2,1	20–70	i.u.
<i>Salvia pratensis</i>	ängssalvia	i.u.	160–300	i.u.	1,0–1,1	0,8	70	förmiddag
<i>Salvia sclarea</i>	muskatellsalvia	i.u.	180–239	i.u.	i.u.	0,390–0,450	i.u.	i.u.
<i>Salvia splendens</i>	praktsalvia	ljusbrun	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Salvia verticillata</i>	kranssalvia	brunt vitaktig	190–300 (500–600)	40–50	0,4	i.u.	65	11:00–15:00
<i>Salvia viridis</i>	broksalvia	gulorange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Sanguinaria officinalis</i>	blodtopp	mörkt blå-blågrön	i.u.	i.u.	i.u.	0,40–0,61	i.u.	i.u.
<i>Satureja hortensis</i>	sommarkyndel	gräddvit	150–300	40	0,16	i.u.	40–85	i.u.
<i>Scabiosa spp.</i>	fältväddssläktet	i.u.	25	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Scilla bifolia</i>	tidig blåstjärna	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	0,11–0,13	i.u.	i.u.
<i>Scilla sibirica</i>	rysk blåstjärna	marinblå-gräddvit	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	9:00–16:00

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/ dygn)	%	
<i>Scrophularia nodosa</i>	flenört	gul	700–900	240	5–8	i.u.	30–70	i.u.
<i>Sedum acre</i>	gul fetknopp	gul	100–150	10	2–2,25	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Sedum kamschaticum</i>	kamtjatkafetblad	gul	50–250	i.u.	0,11	i.u.	30–70	10:00–12:00
<i>Sedum spurium</i>	kaukasiskt fetblad	brunt olivgrön	25	40	0,14	i.u.	60–80	i.u.
<i>Sempervivum spp</i>	taklökssläktet	rödaktigt ljusbrun	400	i.u.	i.u.	i.u.	30–70	10:00–18:00
<i>Senecio ovatus</i>	glesstånds	i.u.	200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Sida hemaphrodita</i>	virginiansk malva	gulaktigt gräddvit	110–280	i.u.	1,8–3,6	i.u.	25–70	i.u.
<i>Silene flos-cuculi</i>	gökblomster	grå-beige	60	3	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Silphium perfoliatum</i>	skålört	gulorange	100–560	200–3600	0,4–0,8	i.u.	40–60	i.u.
<i>Silybum marianum</i>	mariastel	gråviolett	60–120	i.u.	0,4	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Sinapis alba</i>	vitsenap	blekt gröngul	30–100 (160)	80–200	0,1–0,4	i.u.	24–60	morgon (pollen)
<i>Sinapis arvensis</i>	åkersenap	ljus olivgrön	70–100	35–100	1–1,25	i.u.	20–75	i.u.
<i>Sisymbrium officinale</i>	vägsenap	i.u.	22	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Sisymbrium polymorphum</i>	gatsenap	i.u.	300–400	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Solidago canadensis</i>	kanadensiskt gullris	tegelorange	200–900	45–90	i.u.	i.u.	40–70	10:00–16:00
<i>Solidago gigantea</i>	höstgullris	tegelorange	200–800	30–70	i.u.	i.u.	30–70	10:00–15:00/ 25–30°
<i>Solidago hybrida</i>	hybridgullris	tegelorange	460	100–200	i.u.	i.u.	i.u.	10:00–15:00
<i>Solidago virgaurea</i>	gullris	orangebrun	10–500	40–70	0,5–1,36	i.u.	20–70	10:00–12:00 (nektar) 12:00–14:00 (pollen)
<i>Stachys byzantina</i>	lammörön	gräddvit	140	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Stachys palustris</i>	knölsyska	gulbrun	100–120	i.u.	0,4–0,7	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Succisa pratensis</i>	ängsvädd	i.u.	200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>	höstaster	gul-brandgul	50–60	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Symphytum officinale</i>	äkta vallört	gräddvit	35–100	6–17	i.u.	1,0–1,6	35–39	i.u.
<i>Tagetes patula</i>	sammetsblomster	i.u.	10–20	120	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Tanacetum vulgare</i>	renfana	orangebrun	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Taraxacum vulgare</i>	maskros	orange	20–45	300	i.u.	0,2–0,4	40–55	morgon (pollen)
<i>Teucrium spp.</i>	gamandrar	brunaktigt	200–700	i.u.	i.u.	i.u.	61	i.u.
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	aklejruta	gul	0	2100–3600	i.u.	i.u.	i.u.	8:00–10:00 (pollen)
<i>Thymus pulegioides</i>	stortimjan	i.u.	40–200	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.

Art		Pollenets färg	Potentiell honungs-skörd	Potentiell pollens-skörd	Nektarutsöndring		Nektarns socker-värde	Optimal tidpunkt/ optimal temperatur
Vetenskapliga namn	Svenska namn		kg/hektar	kg/hektar	totalt under blommans livstid (mg socker)	dygns-produktion per blomma (mg socker/dygn)	%	
<i>Thymus serpyllum</i>	backtimjan	ljus olivgrön	50–170	i.u.	0,1–0,16	i.u.	15–30	middagstid
<i>Thymus vulgaris</i>	kryddtimjan	gräddvit	120–200 (500)	i.u.	0,05–0,12	i.u.	25–60	9:00–11:00
<i>Tithonia rotundifolia</i>	mexikansk solros	gul	i.u.	230	i.u.	i.u.	i.u.	eftermiddag
<i>Trifolium alexandrinum</i>	aleksandrinklöver	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Trifolium campestre</i>	jordklöver	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Trifolium hybridum</i>	alsikeklöver	brungrön	70–200	8–24	0,3–3,2	i.u.	22–64	8:00–18:00
<i>Trifolium incarnatum</i>	blodklöver	i.u.	60–140		0,2–0,4	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Trifolium pratense</i>	rödklöver	mörkbrun	30–120 (200)	20–40	0,04–0,28	i.u.	20–60	24–25°
<i>Trifolium repens</i>	vitklöver	ljusbrun	70–100	25–35	0,05–0,34	i.u.	30–70	24–30°
<i>Trifolium resipunatum</i>	doftklöver	i.u.	100	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Trifolium subterraneum</i>	subklöver	i.u.	25–50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Tropaeolum majus</i>	indiankrasse	orangebrun	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Tulipa spp.</i>	tulpansläktet	gul eller svart	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Tussilago farfara</i>	hästhov	gulorange	60	15–20	i.u.	i.u.	i.u.	9:00–17:00/ minst 10°
<i>Valeriana officinalis</i>	läkevänderot	i.u.	60–100	i.u.	i.u.	0,12	i.u.	i.u.
<i>Verbascum densiflorum</i>	ölandskungsljus	tegelorange	i.u.	75–260	i.u.	i.u.	i.u.	4:00–10:00
<i>Verbascum thapsus</i>	kungsljus	orange	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Verbena hastata</i>	blåverbena	gul	300	i.u.	0,10–0,19	i.u.	50	11:00–14:00
<i>Verbena longifolia</i>	strandveronika	krämnt gul	100–300	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Veronica spicata</i>	axveronika	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	0,48	40	i.u.
<i>Vicia cracca</i>	kråkvicker	gul	180–350	i.u.	0,4–0,5	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Vicia faba</i>	åkerböna (bondböna)	mörkt grågrön	25–60	i.u.	0,3–0,9	i.u.	30	eftermiddag
<i>Vicia sativa</i>	fodervicker	i.u.	10–30	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Vicia villosa</i>	luddvicker	i.u.	25–50	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Viola odorata</i>	luktviol	gul	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Viscaria vulgaris</i>	tjärblomster	vitgrå	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.
<i>Zea mays</i>	majs	ljusgul	0	20–25	i.u.	i.u.	i.u.	förmiddag
<i>Zinnia elegans</i>	praktzinnia	gulorange	70	30–60	2,3	i.u.	20–37	i.u.

Pollenets proteininnehåll

Tabell 3. Tabellen beskriver olika örter pollenvärde med proteinhalt i %

Latin	Svenska	proteinhalt i pollen %	Latin	Svenska	proteinhalt i pollen %
<i>Allium spp.</i>	löksläktet	24	<i>Limonium spp.</i>	rispar	16
<i>Asphodelus fistulosus</i>	pipafodill	14	<i>Melilotus officinalis</i>	gul sötväppling	24
<i>Brassica napus</i>	höstraps	24–27	<i>Papaver orientale</i>	orientvallmo	20–45
<i>Brassica rapa</i>	rybs, rova	30	<i>Papaver rhoeas</i>	kornvallmo	24–25
<i>Carduus nutans</i>	nicktistel	15	<i>Pastinaca sativa</i>	palsternacka	23
<i>Carthamus spp.</i>	safflor	18	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	honungsört	30
<i>Centaurea cyanus</i>	blåklint	21	<i>Pimpinella peregrina</i>	lång bocksrot	28
<i>Centaurea scabiosa</i>	väddklint	24	<i>Polygonum aviculare</i>	trampört	14
<i>Chenopodium album</i>	svinmålla	16	<i>Portulacea oleracea</i>	portlak	16
<i>Chondrilla juncea</i>	risfibbla	22	<i>Ranunculus spp.</i>	ranunkelsläktet	15–19
<i>Chrysanthemum spp.</i>	chrysanthemum	14	<i>Rapistrum rugosum</i>	stäppsena	22–24
<i>Cichorium intybus</i>	cikoria	15	<i>Reseda spp.</i>	resedor	28
<i>Cirsium vulgare</i>	vägtistel	16–18	<i>Salvia verbenacia</i>	fliksalvia	23
<i>Cistus spp.</i>	cistrosor	17	<i>Scabiosa spp.</i>	fältväddar	25
<i>Ecballium elaterium</i>	sprutgurka	28	<i>Silene flos-cuculi</i>	gökblomster	45
<i>Echium vulgare</i>	blåeld	35	<i>Silybum marianum</i>	mariatistel	23–24
<i>Epilobium angustifolium</i>	mjölkört	21	<i>Sinapis alba</i>	vitsenap	22
<i>Fagopyrum esculentum</i>	bovete	11	<i>Sisymbrium irio</i>	vallsenap	22,3
<i>Fallopia spp.</i>	sliden	30	<i>Sisymbrium officinale</i>	vägsenap	22
<i>Filipendula spp.</i>	älgrässläktet	19	<i>Sonchus spp.</i>	målkesläktet	17
<i>Helianthus annuus</i>	solros	15	<i>Taraxacum vulgare</i>	maskros	18–19
<i>Hypericum spp.</i>	johannesörter	30	<i>Trifolium pratense</i>	rödklöver	25–28
<i>Hypochaeris radicata</i>	rotfibbla	15–18	<i>Trifolium repens</i>	vitklöver	26–27
<i>Lamium spp.</i>	plistersläktet	25	<i>Verbascum spp.</i>	kungsljussläktet	30
<i>Lavandula angustifolium</i>	lavendel	19	<i>Vicia cracca</i>	kråkvicker	27
<i>Lupinus angustifolius</i>	blålupin	28–35	<i>Vicia faba</i>	åkerböna (bondböna)	22–24
			<i>Zea mays</i>	majs	15

Index – svenska och vetenskapliga namn

Tabell 4. Här kan man finna det vetenskapliga namnet om man känner till det svenska namnet.

Svenska namn	Vetenskapliga namn	Svenska namn	Vetenskapliga namn	Svenska namn	Vetenskapliga namn
flodmalva	<i>Sida hemaphrodita</i>	blodklöver	<i>Trifolium incarnatum</i>	citronmeliss	<i>Melissa officinalis</i>
afghanperovskia	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	blodnäva	<i>Geranium sanguinum</i>	clarkia	<i>Clarkia unguiculata</i>
aftonstjärna	<i>Ornithogalum spp.</i>	blodört	<i>Sanguinaria canadensis</i>	clarkior	<i>Godetia spp.</i>
agerater	<i>Ageratum spp.</i>	blomsterlupin	<i>Lupinus polyphyllus</i>	dagliljor	<i>Hemerocallis spp.</i>
akleja	<i>Aquilegia vulgaris</i>	blomvass	<i>Butomus umbellatus</i>	dagöga	<i>Heliopsis helianthoides</i>
aklejruta	<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	blå bolltistel	<i>Echinops bannaticus</i>	dahlia	<i>Dahlia cultorum</i>
alexandrinerklöver	<i>Trifolium alexandrinum</i>	blåeld	<i>Echium vulgare</i>	dill	<i>Anethum graveolans</i>
alsikeklöver	<i>Trifolium hybridum</i>	blågull	<i>Polemonium coerulium</i>	drakblommor	<i>Dracocephalum spp.</i>
alunrotsläktet	<i>Heuchera spp.</i>	blåklint	<i>Centaurea cyanus</i>	drakmynta	<i>Physostegia virginiana</i>
anagrambräcka	<i>Tellima grandiflora</i>	blålupin	<i>Lupinus angustifolius</i>	dånsläktet	<i>Galeopsis spp.</i>
anisisop	<i>Agastache foeniculum</i>	blålusern	<i>Medicago sativa</i>	elegant clarkia	<i>Clarkia elegans</i>
armenisk pärlhyacint	<i>Muscaria armeniacum</i>	blåmunk	<i>Jasione montana</i>	engelsk klockhyacint	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>
aubretia	<i>Aubretia cultorum</i>	blåsippa	<i>Hepatica nobilis</i>	esparsett	<i>Onobrychis viciifolia</i>
axveronika	<i>Veronica spicata</i>	blåsuga	<i>Ajuga pyramidalis</i>	fackelblomster	<i>Lythrium salicaria</i>
backklöver	<i>Trifolium montanum</i>	blåverbena	<i>Verbena hastata</i>	fackelliljesläktet	<i>Kniphofia spp.</i>
backlök	<i>Allium oleraceum</i>	bockrot	<i>Pimpinella saxifraga</i>	fagertrav	<i>Arabis caucasica</i>
backsippa	<i>Anemone pulsatilla</i>	bollmåra	<i>Phuopsis stylosa</i>	fingerborgsblomma	<i>Digitalis purpurea</i>
backsippa	<i>Pulsatilla vulgaris</i>	bolmört	<i>Hyoscyamus niger</i>	fingerörtssläktet	<i>Potentilla spp.</i>
backtimjan	<i>Thymus serpyllum</i>	bosyska	<i>Ballota nigra</i>	fjällskräp	<i>Petasites frigidus</i>
balkanmalva	<i>Kitaibelia vitifolia</i>	bovete	<i>Fagopyrum esculentum</i>	fjälltrav	<i>Arabis alpina</i>
balkansippa	<i>Anemone blanda</i>	bredbladig lavendel	<i>Lavandula spica</i>	flenört	<i>Scrophularia nodosa</i>
basilika	<i>Ocimum basilicum</i>	brudborste	<i>Cirsium heterophyllum</i>	fläcklungört	<i>Pulmonaria officinalis</i>
batatsläktet	<i>Ipomoea spp.</i>	brudslöja	<i>Gypsophila paniculata</i>	fodervicker	<i>Vicia sativa</i>
begoniasläktet	<i>Begonia spp.</i>	brunnäva	<i>Geranium phaeum</i>	fuchsia	<i>Fuchsia magellanica</i>
belladonna	<i>Atropa belladonna</i>	brunört	<i>Prunella vulgaris</i>	funkiasläktet	<i>Hosta spp.</i>
bergenia	<i>Bergenia spp.</i>	bräckor	<i>Saxifraga spp.</i>	fyrkantig johannesört	<i>Hypericum maculatum</i>
bergklint	<i>Centaurea montana</i>	brödkummin	<i>Carum carvi</i>	fårtunga	<i>Anchusa arvensis</i>
bergmyntor	<i>Clinopodium spp.</i>	bäcktistel	<i>Cirsium rivulare</i>	fältvädd	<i>Scabiosa columbaria</i>
björnlöka	<i>Heracleum sphondylium</i>	cikoria	<i>Cichorium intybus</i>	fänkål	<i>Foeniculum vulgare</i>
		cistus-rosor	<i>Cistus spp.</i>	färgkragesläktet	<i>Glebionis spp.</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
färgkulla	<i>Anthemis tinctoria</i>
färgreseda	<i>Reseda luteola</i>
färgväpplingsläktet	<i>Baptisia spp.</i>
färgväxlare	<i>Lithospermum spp.</i>
förgätmigejläktet	<i>Myosotis spp.</i>
gamandrar	<i>Teucrium spp.</i>
gatsenaper	<i>Sisymbrium spp.</i>
gazania-hybrider	<i>Gazania spp.</i>
gemsrot	<i>Doronicum orientale</i>
gentianasläktet	<i>Gentiana spp.</i>
getrams	<i>Polygonatum odoratum</i>
getruta	<i>Galega officinalis</i>
getväppling	<i>Anthyllis vulneraria</i>
gilor	<i>Gilia spp.</i>
glansblomssläktet	<i>Lampranthus spp.</i>
grindellor	<i>Grindelia spp.</i>
grobladsväxter	<i>Plantago spp.</i>
grå bolltistel	<i>Echinops exaltatus</i>
gråmalva	<i>Lavatera thuringiaca</i>
gråmynta	<i>Mentha longifolia</i>
gräslök	<i>Allium schoenoprasum</i>
gul fetknopp	<i>Sedum acre</i>
gul middagsblomma	<i>Carpobrotus edulis</i>
gul nunneört	<i>Corydalis lutea</i>
gul näckros	<i>Nuphar lutea</i>
guldstjärna	<i>Chrysogonum virginianum</i>
gulklint	<i>Centaurea macrocephala</i>
gullklöver	<i>Trifolium aureum</i>
gullris	<i>Solidago virgaurea</i>
gullskära	<i>Cosmos sulphureus</i>
gullupin	<i>Lupinus luteus</i>
gulplister	<i>Lamium galeobdolon</i>
gulreseda	<i>Reseda lutea</i>
gulsporre	<i>Linaria vulgaris</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
gulvial	<i>Lathyrus pratensis</i>
gurka	<i>Cucumis sativus</i>
gurkört	<i>Borago officinalis</i>
gyckelblomma	<i>Mimulus guttatus</i>
gyllenlak	<i>Erysimum cheiri</i>
gökbloster	<i>Lychnis flos-cuculi</i>
gökbloster	<i>Silene flos-cuculi</i>
hampa	<i>Cannabis sativa</i>
hampflockel	<i>Eupatorium cannabinum</i>
hebesläktet	<i>Hebe spp.</i>
heliotrop	<i>Heliotropium arborescens</i>
hjärtstilla	<i>Leonurus cardiaca</i>
honungsmynta	<i>Melittis melissophyllum</i>
honungsört	<i>Phacelia tanacetifolia</i>
hornvallmosläktet	<i>Glaucium spp.</i>
humle	<i>Humulus lupulus</i>
humleblomster	<i>Geum rivale</i>
humlelusern	<i>Medicago lupulina</i>
humlesuga	<i>Stachys officinalis</i>
hundkax	<i>Antriscus silvestris</i>
hundtunga	<i>Cynoglossum officinale</i>
hyacint	<i>Hyacinthus orientalis</i>
hybridmartorn	<i>Eryngium hybridum</i>
hålnunneört	<i>Corydalis cava</i>
hårgurkor	<i>Sicyos spp.</i>
häckvicker	<i>Vicia sepium</i>
hästhov	<i>Tussilago farfara</i>
hästskoklöver	<i>Hippocrepis comosa</i>
hökfibblesläktet	<i>Hieracium spp.</i>
höskallra	<i>Rhinanthus serotinus</i>
höstanemon	<i>Anemone huphenensis</i>
höstaster	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i>
höstastersläktet	<i>Symphyotrichum spp.</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
höstfibbla	<i>Leontodon autumnalis</i>
höstflox	<i>Phlox drummondii</i>
höstgullris	<i>Solidago gigantea</i>
höstraps	<i>Brassica napus</i>
höstrudbeckia	<i>Rudbeckia laciniata</i>
höstrybs	<i>Brassica rapa</i>
iberisar	<i>Iberis spp.</i>
indiankrasse	<i>Tropaeolum majus</i>
isop	<i>Hyssopus officinalis</i>
japansk persilja	<i>Cryptotaenia japonica</i>
jordgubbe	<i>Fragaria x ananassa</i>
jordklöver	<i>Trifolium campestre</i>
jordreva	<i>Glechoma hederacea</i>
jordrökar	<i>Fumaria spp.</i>
jordärtskocka	<i>Helianthus tuberosus</i>
judaspenningar	<i>Lunaria annua</i>
judekors	<i>Physalis alkekengi</i>
julrossläktet	<i>Helleborus spp.</i>
junfrulin	<i>Polygala vulgaris</i>
jungfrun i det gröna	<i>Nigella damascena</i>
jättebalsamin	<i>Impatiens grandulifera</i>
jätteleka	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
jättelek	<i>Allium giganteum</i>
jättepumpa	<i>Cucurbita maxima</i>
jätteslide	<i>Reynoutria sachalinensis</i>
jättestäppilja	<i>Eremurus robustus</i>
kabbeleka	<i>Caltha palustris</i>
kammynta	<i>Elsholtzia ciliata</i>
kamomill	<i>Matricaria chamomilla</i>
kamtjatkafetblad	<i>Sedum kamschaticum</i>
kanadensiskt gullris	<i>Solidago canadensis</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
kantnepeta	<i>Nepeta faassenii</i>
kaphyacint	<i>Ornithogalum candicans</i>
kardon	<i>Cynara cardunculus</i>
kardvädd	<i>Dipsacus fullonum</i>
kardväddsläktet	<i>Dipsacus spp.</i>
kattmynta	<i>Nepeta cataria</i>
kaukasisk förgätmigej	<i>Brunnera macrophylla</i>
kaukasiskt fetblad	<i>Sedum spurium</i>
kaukasusnäva	<i>Geranium platypetalum</i>
kaveldun	<i>Typha latifolia</i>
kejsarkrona	<i>Fritillaria imperialis</i>
kepalök	<i>Allium cepa</i>
kinesisk kärleksört	<i>Hylotelephium spectabile</i>
kinesiskt kärleksört	<i>Sedum spectabile</i>
kirskål (kers)	<i>Aegopodium podagraria</i>
klippstånds	<i>Ligularia dentata</i>
klofibblesläktet	<i>Crepis spp.</i>
klöveroxalis	<i>Oxalis stricta</i>
knölklocka	<i>Campanula rapunculoides</i>
knölsyska	<i>Stachys palustris</i>
kokardblomsläktet	<i>Gaillardia spp.</i>
konvaljbuske	<i>Clethra alnifolia</i>
koreansk anisop	<i>Agastache rugosa</i>
koriander	<i>Coriandrum sativum</i>
kornvallmo	<i>Papaver rhoeas</i>
korsörtssläktet	<i>Senecio spp.</i>
kransborre	<i>Marrubium vulgare</i>
kranssalvia	<i>Salvia verticillata</i>
krissla	<i>Inula salicina</i>
krustistel	<i>Carduus crispus</i>
kryddsalvia	<i>Salvia officinalis</i>
kryddtimjan	<i>Thymus vulgaris</i>
krysantemumhybrider	<i>Chrysanthemum x grandifolium</i>
krysantemumsläktet	<i>Chrysanthemum spp.</i>
kräklöver	<i>Potentilla palustris</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
kråkvicker	<i>Vicia cracca</i>
kungsljus	<i>Verbascum thapsus</i>
kungsmynta	<i>Origanum vulgare</i>
kvanne	<i>Angelica archangelica</i>
kål (ätlig)	<i>Brassica oleracea</i>
kålrabbi	<i>Brassica oleracea var. gongylodes</i>
kåltistel	<i>Cirsium oleraceum</i>
källfräne	<i>Nasturtium officinale</i>
käringtand	<i>Lotus corniculatus</i>
kärleksört	<i>Sedum telephium även Hylotelephium..</i>
kärrtistel	<i>Cirsium palustre</i>
lammöron	<i>Stachys byzantina</i>
lavendel	<i>Lavandula angustifolia</i>
lejongap	<i>Antirrhinum majus</i>
libbsticka	<i>Levisticum officinale</i>
liljekonvalj	<i>Convallaria majalis</i>
liljesläktet	<i>Lilium spp.</i>
lin	<i>Linum usitatissimum</i>
liten blåklocka	<i>Campanula rotundifolia</i>
liten tagetes	<i>Tagetes tenuifolia</i>
ljusöga	<i>Buphtalmum salicifolium</i>
lobelia	<i>Lobelia erinus</i>
luddvicker	<i>Vicia villosa</i>
luktreseda	<i>Reseda odorata</i>
luktvio	<i>Viola odorata</i>
lungört	<i>Pulmonaria obscura</i>
läkemalva	<i>Althea officinalis</i>
läkevänderot	<i>Valeriana officinalis</i>
löktrav	<i>Alliaria petiolata</i>
majs	<i>Zea mays</i>
malört	<i>Artemisia absinthium</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
mariaklocka	<i>Campanula medium</i>
mariatistel	<i>Silybum marianum</i>
marrisp	<i>Limonium vulgare</i>
maskros	<i>Taraxacum vulgare</i>
mattram	<i>Tanacetum partheum</i>
melon	<i>Cucumis melo</i>
mexikansk solros	<i>Tithonia rotundifolia</i>
midsommarblomster	<i>Geranium sylvaticum</i>
mjölkört/mjölke	<i>Chamerion angustifolium</i>
molkesläktet	<i>Sonchus spp</i>
montbretiasläktet	<i>Crocsmia spp.</i>
morot	<i>Daucus carota sativa</i>
mose brinnande buske	<i>Dictamnus albus</i>
mossflox	<i>Phlox subulata</i>
murreva	<i>Cymbalaria muralis</i>
muskatellsalvia	<i>Salvia sclarea</i>
myrlilja	<i>Nartheicum ossifragum</i>
myskmalva	<i>Malva moschata</i>
mårör	<i>Galium spp.</i>
nattljus	<i>Oenothera biennis</i>
nattljus	<i>Oenothera lamarckiana</i>
nejliksläktet	<i>Dianthus spp.</i>
norsk blåstjärna	<i>Scilla verna</i>
nävesläktet	<i>Geranium spp.</i>
oljedådra	<i>Camelina sativa</i>
oljerättika	<i>Raphanus sativus var. oleiformis</i>
orange sidenört	<i>Asclepias tuberosa</i>
orientvallmo	<i>Papaver orientale</i>
ormrot	<i>Bistorta spp.</i>
ormöga	<i>Omphalodes verna</i>
oxtung	<i>Anchusa officinalis</i>
palsternacka	<i>Pastinaca sativa</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn	Svenska namn	Vetenskapliga namn	Svenska namn	Vetenskapliga namn
paradisblomster	<i>Cleome hassleriana</i>	rabarberklintar	<i>Stemmacantha spp.</i>	safflor	<i>Carthamus tinctorius</i>
parkslide	<i>Reynoutria japonica</i>	ramslök	<i>Allium ursinum</i>	sammetsmalva	<i>Sida cordifolia</i>
patriniasläktet	<i>Patrinia spp.</i>	rapunkler	<i>Phyteuma spp.</i>	sammetsagetes	<i>Tagetes patula</i>
pelargonsläktet	<i>Pelargonium spp.</i>	renfana	<i>Tanacetum vulgare</i>	sandliljesläktet	<i>Anthericum spp.</i>
penningört	<i>Thlaspi arvense</i>	revsuga	<i>Ajuga reptans</i>	sandvita	<i>Berteroa incana</i>
penstemonsläktet	<i>Penstemon spp.</i>	ricin	<i>Ricinus communis</i>	selleri	<i>Apium graveolens</i>
pepparmynta	<i>Mentha x piperita</i>	riddarsporre	<i>Delphinium spp.</i>	senapskål	<i>Eruca sativa</i>
perezia	<i>Perezia multiflora</i>	riddarsporre (ettårig)	<i>Consolida regalis</i>	serradella	<i>Ornithopus sativus</i>
persilja	<i>Petroselinium crispum</i>	riddarsporre (hybrid)	<i>Delphinium hybridum</i>	sibirisk björnloka	<i>Heracleum sibiricum</i>
persisk klöver	<i>Trifolium resipunatum</i>	ringblomma	<i>Calendula officinalis</i>	sidenört	<i>Asclepias syriaca</i>
pestskräp	<i>Petasites hybridus</i>	rodgersia	<i>Rodgersia spp.</i>	silverarv	<i>Cerastium tomentosum</i>
petrocallis	<i>Petrocallis spp.</i>	rosenböna	<i>Phaseolus coccineus</i>	skatnävor	<i>Erodium spp.</i>
pimpinellsläktet	<i>Sanguisorba spp.</i>	rosendunört	<i>Epilobium hirsutum</i>	skelört	<i>Chellidonium majus</i>
pingstlilja	<i>Narcissus poeticus</i>	rosenplister	<i>Lamium maculatum</i>	skobandssolros	<i>Helianthus salicifolius</i>
pionsläktet	<i>Paeonia spp.</i>	rosensideört	<i>Asclepias incarnata</i>	skogklöver	<i>Trifolium medium</i>
pipörtssläktet	<i>Centranthus spp.</i>	rosenskära	<i>Cosmos bipinnatus</i>	skogskovall	<i>Melampyrum sylvaticum</i>
plymastilbe	<i>Astilbe chinensis</i>	rosenstav	<i>Liatris spicata</i>	skräppor	<i>Rumex spp.</i>
plymspireor	<i>Aruncus spp.</i>	rosmarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>	skuggliljesläktet	<i>Tricyrtis spp.</i>
porslinshyacin	<i>Puschkinia scilloides</i>	rotfibbla	<i>Hypochaeris radicata</i>	skålört	<i>Silphium perfoliatum</i>
potatissläktet	<i>Solanum spp.</i>	rysk martorn	<i>Eryngium planum</i>	skär kattost	<i>Malva neglecta</i>
praktklocka	<i>Platycodon grandiflorus</i>	rädisa	<i>Raphanus sativus</i>	sköldbräckor	<i>Darmera spp.</i>
praktlobelia	<i>Lobelia fulgens</i>	röd axmalva	<i>Sidalcea malviflora</i>	slättergubbe	<i>Arnica montana</i>
praktmalva	<i>Malope trifida</i>	röd hundrova	<i>Bryonia dioica</i>	smultron	<i>Fragaria vesca</i>
praktstenört	<i>Aurinia saxatile</i>	röd sidenört	<i>Asclepias curassavica</i>	småborre	<i>Agrimonia eupatoria</i>
praktveronika	<i>Veronica teucrium</i>	röd solhatt	<i>Echinacea purpurea</i>	småtistlar	<i>Carlina spp.</i>
praktzinnia	<i>Zinnia elegans</i>	röd temynta	<i>Monarda didyma</i>	smällglim	<i>Silene vulgaris</i>
prins gustafs öga	<i>Nemophila menziesii</i>	rödblära	<i>Silene dioica</i>	smörblomma	<i>Ranunculus acris</i>
prästkra	<i>Leucanthemum vulgare</i>	röd klint	<i>Centaurea jacea</i>	smörbollor	<i>Trollius spp.</i>
puktörnesläktet	<i>Ononis spp.</i>	röd klöver	<i>Trifolium pratense</i>	snyltrotsläktet	<i>Orobancha spp.</i>
pumpa, squash	<i>Cucurbita pepo</i>	röd malva	<i>Malva sylvestris</i>	snårvinda	<i>Calystegia sepium</i>
pumpasläktet	<i>Cucurbita spp.</i>	röd plister	<i>Lamium purpureum</i>	snärjor	<i>Cuscuta spp.</i>
purjo	<i>Allium porrum</i>	rödsallater	<i>Prenanthes spp.</i>	snödroppe	<i>Galanthus nivalis</i>
pyncnanthemumsläktet	<i>Pycnanthemum spp.</i>	röllika	<i>Achillea millefolium</i>	snöklöcka	<i>Leucojum vernum</i>
pärlyhyacin	<i>Muscaria botryoides</i>			solbrud	<i>Helenium autumnale</i>
pärmlalört	<i>Artemisia lactiflora</i>			solros	<i>Helianthus annuus</i>
rabarber	<i>Rheum spp.</i>			solvända	<i>Helianthemum spp.</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
sommaraster	<i>Calistephus spp.</i>
sommarbinka	<i>Erigeron annuus</i>
sommargyllen	<i>Barbarea vulgaris</i>
sommarkyndel	<i>Satureja hortensis</i>
sommarmalva	<i>Lavatera trimestris</i>
spansk körvel	<i>Myrrhis odorata</i>
spansk salvia	<i>Salvia lavandulifolia</i>
sparris	<i>Asparagus officinalis</i>
spetsmössor	<i>Tiarella spp.</i>
spirstånds	<i>Ligularia przewalskii</i>
springkorn	<i>Impatiens noli-tangere</i>
stenkyndel	<i>Calamintha nepeta</i>
stinknäva	<i>Geranium robertianum</i>
stjärnflocka	<i>Astrantia major</i>
stjärnhyacintsläktet	<i>Camassia spp.</i>
stjärnklocka	<i>Campanula poscharskyana</i>
stockros	<i>Alcea rosea</i>
stor kardborre	<i>Arctium lappa</i>
stor nunneört	<i>Corydalis solida</i>
stor ormrot	<i>Bistorta officinalis</i>
stor ormrot	<i>Polygonum bistorta</i>
stor vårstjärna	<i>Chinodoxa lucilae</i>
stortimjña	<i>Thymus pulegioides</i>
strandaster	<i>Tripolium vulgare</i>
strandklo	<i>Lycopus europaeus</i>
strandkrassing	<i>Lobularia maritima</i>
strandkål	<i>Crambe maritima</i>
strandloppört	<i>Pulicaria dysenterica</i>
strandlysing	<i>Lysimachia vulgaris</i>
strandveronika	<i>Veronica longifolia</i>
strätta	<i>Angelica sylvestris</i>
sträv rudbeckia	<i>Rudbeckia hirta</i>
styvmorsviol	<i>Viola tricolor</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
stånds	<i>Senecio jacobaea</i>
stäppnepeta	<i>Nepeta nuda</i>
stäppsalia	<i>Salvia nemorosa</i>
subklöver	<i>Trifolium subterraneum</i>
sumpört	<i>Limnanthes douglasii</i>
svalting	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
svalört	<i>Ficaria verna</i>
svalört	<i>Ranunculus ficaria</i>
svartklint	<i>Centaurea nigra</i>
svartkummin	<i>Nigella sativa</i>
svinmålla	<i>Chenopodium album</i>
svärdslilja	<i>Iris pseudacorus</i>
sydcikoria (endiv)	<i>Cichorium endivia</i>
såpnejlika	<i>Saponaria officinalis</i>
sömntuta	<i>Eschscholzia californica</i>
sötväppling (gul)	<i>Melilotus officinalis</i>
sötväppling (vit)	<i>Melilotus albus</i>
taggreva	<i>Echinocystis lobata</i>
taklökssläktet	<i>Sempervivum spp</i>
tidlösa (höstblommande)	<i>Colchicum autumnale</i>
tidlösa (vårblommande)	<i>Colchicum vernalis</i>
tistel	<i>Carduus spp./ Cirsium spp.</i>
tjärblomster	<i>Viscaria vulgaris (syn. Lychnis viscaria)</i>
Tobakssläktet	<i>Nicotiana spp.</i>
torta	<i>Cicerbita alpina</i>
trampörtssläktet	<i>Polygonum spp.</i>
tremastarblomma	<i>Tradescantia X andersoniana</i>
trift	<i>Armeria maritima</i>
trolldruveläktet	<i>Cimicifuga spp.</i>
tromsöloka	<i>Heracleum persicum</i>
trädklöver	<i>Trifolium dubium</i>
trädgårdsdahlia	<i>Dahlia pinnata</i>
trädgårdsnattviol	<i>Hesperis matronalis</i>
trädgårdsveronika	<i>Veronica persica</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
tulkört	<i>Vincetoxum hinduriana</i>
turkisk drakblomma	<i>Dracocephalum moldavica</i>
tusensköna	<i>Bellis perennis</i>
tuvig blåstjärna	<i>Scilla amoena</i>
tuvull	<i>Eriophorum vaginatum</i>
törelväxter	<i>Euphorbia spp.</i>
ullkardborre	<i>Arctium tomentosum</i>
ulltistel	<i>Onopordum acanthium</i>
ungersk timjan	<i>Thymus pannonicus</i>
waldsteiniasläktet	<i>Waldsteinia spp.</i>
vattenklöver	<i>Menyanthes trifoliata</i>
vaxblomma	<i>Cerinth spp.</i>
vedelsläktet	<i>Astragalus spp.</i>
vejde	<i>Isatis tinctoria</i>
vildtulpan	<i>Tulipa sylvestris</i>
vingstam	<i>Verbesina alternifolia</i>
vinruta	<i>Ruta graveolens</i>
vintergäck	<i>Eranthis hyemalis</i>
vinterkyndel	<i>Satureja montana</i>
violruta	<i>Thalictrum delavayi</i>
vit bolltistel	<i>Echinops sphaerocephalus</i>
vit fetknopp	<i>Sedum album</i>
vit näckros	<i>Nymphaea alba</i>
vitklöver	<i>Trifolium repens</i>
vitplister	<i>Lamium album</i>
vitsenap (-gul)	<i>Sinapis alba</i>
vitsippa	<i>Anemone nemorosa</i>
vitskråp	<i>Petasites albus</i>
vivesläktet	<i>Primula spp.</i>
våradonis	<i>Adonis vernalis</i>
vårkrokus	<i>Crocus vernus</i>
vårlök	<i>Gagea lutea</i>
vårrops	<i>Brassica napus</i>
vårrys	<i>Brassica rapa</i>
vårskönor	<i>Claytonia spp.</i>
vårstjärnor	<i>Scilla spp.</i>
våtarv	<i>Stellaria media</i>

Svenska namn	Vetenskapliga namn
väddkling	<i>Centaurea scabiosa</i>
vägtistel	<i>Cirsium vulgare</i>
vätters	<i>Lathraea squamaria</i>
värvarda	<i>Dipsacus sativus</i>
åkerböna (bonböna)	<i>Vicia faba</i>
åkerkål	<i>Brassica rapa ssp. campestris</i>
åkerdadd	<i>Sherardia arvensis</i>
åkernejlika	<i>Vaccaria hispanica</i>
åkerrettika	<i>Raphanus raphanistrum</i>
åkerrodtoppa	<i>Odontites vernus</i>
åkersenap	<i>Sinapis arvensis</i>
åkerspärjel	<i>Spergula arvensis</i>
åkertistel	<i>Cirsium arvense</i>
åkerbinda	<i>Convolvulus arvensis</i>
åkervädd	<i>Knautia arvensis</i>
äka johannesört	<i>Hypericum perforatum</i>
äka stormhatt	<i>Aconitum napellus</i>
äka vallört	<i>Symphytum officinale</i>
älggräs	<i>Filipendula ulmaria</i>
ängsbräsa	<i>Cardamine pratensis</i>
ängshaverot	<i>Tragopogon pratense</i>
ängskovall	<i>Melampyrum pratense</i>
ängsnäva	<i>Geranium pratense</i>
ängssalvia	<i>Salvia pratensis</i>
ängsskallra	<i>Rhinanthus minor</i>
ängsviol	<i>Viola canina</i>
ängsvädd	<i>Succisa pratensis</i>
ärenpris	<i>Veronica officinalis</i>
ärt	<i>Pisum sativum hortense</i>
ögonblomsläktet	<i>Coreopsis spp.</i>
ögontröstsläktet	<i>Euphrasia spp.</i>
ölandskungsljus	<i>Verbascum densiflorum</i>



Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Tfn 036-15 50 00 (vx)
E-post: jordbruksverket@jordbruksverket.se
www.jordbruksverket.se